











# গোলাপ বাডী

---

‘কৃষিক্ষেত্র,’ ‘সবজীবাগ,’ ‘ফলকর,’ ‘মালঞ্চ’ প্রভৃতির

প্রণেতা

শ্রী প্রবোধচন্দ্র দে, F. R. H. S.

*Late Superintendent of Gardens, Raj-Durbhanga,  
of the Nizamat Gardens, Murshedabad,  
Formerly of the Cossipur Horticultural  
Institution*

প্রণীত

---

কলিকাতা

সন ১৩১৫ সাল।

৩ নং ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীটস্থ “ইণ্ডিসিয়াম প্রেসে”

শ্রীহরিচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

---

*All Rights Reserved.*

মূল্য বার আনা মাত্র



# উৎসর্গ



অশেষ গুণালঙ্কৃত বহু মানাপদ

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর

মহোদয়ের করকমলে

এই ক্ষুদ্র

গোলাপ-বাড়ী'

গ্রন্থকারের

প্রাণম্পর্শী শ্রদ্ধা সহকারে

অর্পিত হইল।







## ভূমিকা ।

আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় গোলাপ সম্বন্ধে আদৌ কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং ‘গোলাপ-বাড়ী’ বঙ্গ সাহিত্যে নূতন ও একমাত্র পুস্তক। পুস্তক কিন্তু সম্পূর্ণ নহে, একথা আমি নিজেই স্বীকার করিতেছি। গোলাপ সম্বন্ধে লিখিবার ও বলিবার অনেক আছে কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তৎসমুদায়ের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর নহে। নিজের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্তসার সঙ্কলন করিয়া গোলাপোৎসাহীদিগকে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তক প্রকাশিত হইল। প্রকৃত-পক্ষে গোলাপ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ইংরাজি পুস্তক পাঠ করা উচিত। গোলাপবেত্তা মহারথীগণকৃত পুস্তকের তুলনায় ‘গোলাপ-বাড়ী’ অতীব অকিঞ্চিৎকর, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করিয়া যদি কাহারও গোলাপ বিষয়ক আদর্শ পুস্তক পাঠের ইচ্ছা বলবতী হয় তাহা হইলেও আমার কতকটা উদ্দেশ্য সফল হইবে। ষোড়শ বৃষ্টিতে ও শিশির বাতায় জর্জরিত না হইলে উত্তানতায় কেহ অভিজ্ঞ হইতে পারেন না। ইহা আমাদের সাধ্যাতীত বলিয়াই আমরাদিগের মধ্যে অভিজ্ঞ উত্তানকের এত অভাব। গোলাপ সম্বন্ধে পুস্তকের অভাব বড়ই অনুভব করিয়াছিলাম বলিয়া ‘গোলাপ-বাড়ী’ রচনা করিলাম।

কলিকাতা }  
১লা অগ্রহায়ণ সন ১৩১৫ সাল । } শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে



## সূচীপত্র ।

	পৃষ্ঠা ।
প্রথম অধ্যায়—সূচনা, ঐতিহাসিক জন্মস্থান, আব- হাওয়া, ভূমি ও স্থিতিকা . . . . .	১—৬
দ্বিতীয় অধ্যায়—সার, শুয়ানো, গোবর সার, মেঘ ও ছাগল-নাদি, আস্তাবলের আবর্জনা, মুত্র, ঠৈল, অস্থি-চূর্ণ, তরল-সার, সোরা, চাপড়া-পোড়া, নীল-সিটী, নীলের জল, পাকমাটি . . . . .	৬—১৫
তৃতীয় অধ্যায়—রোপণের সময়, চালানী গাছ, বৃক্ষ পরস্পরে ব্যবধান, গাছের গোড়া ঢাকা, রোপণ প্রণালী . . . . .	১৫—২৫
চতুর্থ অধ্যায়—শ্রেণী বিভাগ, হাইব্রিড-পার্পেচুয়াল, বোরবোঁ, মস্, মস্ক, ডামাস্ক, টী, নয়সেট, বোর- সন্ট, ফেয়ারি, জাটগ্যান্টিয়া, ম্যাক্রোফিলা, চায়না বা চীনে গোলাপ . . . . .	২৫—৩৪
পঞ্চম অধ্যায়—ছাঁটিবার উদ্দেশ্য, ছাঁটের সহিত গাছের সম্বন্ধ, ছাঁটাই কার্যে স্বেচ্ছাচারিতা, ছাঁটিবার সাধারণ নিয়ম, ছাঁটিবার সময়, কর্তনের পূর্ব কার্য, যন্ত্রাদি . . . . .	৩৪—৪৭

ষষ্ঠ অধ্যায়—ছেদন, ঘাঁড়া গাছের প্রতীকার, গোলাপের আঞ্জাবহতা, বিকৃত গাছের পুন- রুদ্ধার ... ..	৪৮—৫৮
সপ্তম অধ্যায়—সার প্রদান, জল ওচন, বিমুকুল, কুঁড়ি হরণ, তরল সার, চষন প্রণালী ...	৫৮—৬৪
অষ্টম অধ্যায়—নিয়ন্ত্রিত, প্রাচীরাবরণ, স্তম্ভাকার, ছত্রাকার, গম্বুজাকার, অবনামিত, বিভক্তা- কার, মালাকার, দাঁড়া গাছ, গাছের শোভা ... ..	৬৪—৭৭
নবম অধ্যায়—কলমের প্রকার, খণ্ড-শাখা, জোড়- কলম, চোক-কলম, চোঙ্গ-কলম, জিব-কলম, দাবা-কলম, বীজু ... ..	৭৭—৮৭
দশম অধ্যায়—গোলাপের শত্রু, উই পোকা পতঙ্গ, লাল মাকড়সা, সোঁরা-পোকা, ধূম প্রদান ...	৮৭—৯২
একাদশ অধ্যায়—গোলাপের তালিকা, হাটব্রিড- পাপেচুয়াল, টী, নরজেট, সম, বোরচো, বোর- সন্ট, সুইট-ব্রান্সার, ডামাস্ক, জাইগ্যান্টিয়া, মাইক্রোফিলা ... ..	৯২—১০৬
দ্বাদশ অধ্যায়—গোলাপের সময়, অগ্রোৎপাদন, বিরাম ও আগরণ, বুদ্ধিরোধ... ..	১০৬—১১১
ত্রয়োদশ—অধ্যায়, সৌখিনের সখ, বাবসায়ীর পণ্য আতর ও গোলাপ দ্রষ্টব্য ... ..	১১১—১১৭

# গোলাপ-বাড়ী ।

## প্রথম অধ্যায় ।

সূচনা ।—গোলাপ পুষ্প বড়ই আদরের সামগ্রী । গঠন-পরিপাটা, বর্ণের সৌন্দর্য্য, মৌরভের মাধুর্য্য প্রভৃতির সামঞ্জস্য হেতু ইহা সৰ্ব্বজনপ্রিয় । গাচীন প্রাচীনার কাছে হউক বা যুবক যুবতীর কাছে হউক কিম্বা বালক বালিকা বা শিশুদিগের নিকটে হউক, গোলাপের আদর কোথায় কম বল দেখি ? গোলাপ-পুষ্পে দেবতা সন্তুষ্ট, মানুষ বিহ্বল, স্ত্রীরাং এ ফুলের আদর না হইবে কেন ?—আর সে আদর কেনই বা চিরদিন না থাকিবে ? পৃথিবীর যত বয়স বাড়িতেছে, জন সমাজ যতই সভ্যতার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতেছে গোলাপেরও তত ত্রিবৃদ্ধি হইতেছে,—গোলাপ জাতি তত বিস্তারিত হইয়া পড়িতেছে,—গোলাপের নূতন নূতন জাতি উৎপন্ন হইতেছে । বলা বাহুল্য যে, গোলাপের আদর পৃথিবী ব্যাপিয়া অপ্রতিহত আছে বলিয়াই এত হইতেছে, গোলাপের পক্ষে ইহা বড় কম স্পর্ধার কথা নহে । গোলাপের স্তূপ যখন দেবতার পাদ-পদ্ম সুশোভিত করে, বল দেখি, ভক্তের প্রাণী তখন ভাবে কিরূপ বিভোর হইয়া যায়,—আনন্দে কিরূপ উখলিয়া উঠে ! যুবক যুবতীর সম্মুখে একটি অকৌমুদ্র গোলাপ স্থাপিত হইলে, সেই

যুগল প্রাণে জগৎ-ভরা কবিত্ব ঢালিয়া দেয় কিনা বল দেখি ?  
আবার সেই সুকুমারমতি কোমলগন্ধ শিশুটী যখন ফুল লইয়া  
ক্রিড়া করে তখন তাহার প্রাণে আনন্দ কত !

গোলাপ নানা গুণালঙ্কৃত বলিয়া সুকবি স্যাপ্ফো (Sappho)  
ইহাকে ‘পুষ্পরানী’ (Queen of flowers) নামে অভিহিত  
করিয়া গিয়াছেন এবং তদবধি সংসারের প্রায় তাবৎ লোকেই  
কার্য্য দ্বারা তাঁহার উক্তির যথার্থতার অমুমোদন করিতেছে ও  
সেই নামেরই প্রতিধ্বনি করিতেছে। ইহার আদর দিন দিন  
এত বাড়িতেছে বলিয়াই প্রায় প্রতি বৎসরই আমরা অন্ততঃ দুই  
চারিটা নূতন গোলাপের আবির্ভাব দেখিতে পাই, এবং সেই সঙ্গে  
গোলাপ গাছ ও ফুলের ব্যবসায়ের প্রসার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

এসিয়া, ইয়ুরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা—এই চারি  
মহাদেশেই গোলাপ গাছ স্বভাবতঃ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু বিশ্বয়ের  
স্বাভাবিক বিষয় এই যে, অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ খণ্ডে  
জন্মস্থান। ইহাকে এ পর্য্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া  
যায় নাই। শীতোত্তাপ নির্বিশেষে সকল দেশেই গোলাপের  
স্বভাবিক স্থান আছে। উত্তর-আমেরিকার তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ  
হইতে বারিহীন সাহারার মরুভূমির প্রান্তরে গোলাপকে স্বভাবতঃ  
জন্মিতে দেখা যায়। এই ভারতবর্ষেই নানাবিধ জল-বায়ু  
বিশিষ্ট দেশ আছে। হিমালয়ের শীতপ্রধান স্থানেও ইহা  
জন্মিতেছে আবার অল্প বারিপাতবিশিষ্ট মধ্য ভারতেও  
জন্মিতেছে। পার্শ্বতা প্রদেশের কঙ্করময় দেশে ইহা জন্মিতেছে,  
আবার, বেলে ও এঁটেল মাটিতেও জন্মিতেছে। এই সকল  
কারণে গোলাপ এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

সকল প্রকার জল-বায়ু গোলাপ গাছ সহনক্ষম বলিয়া তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করিবার কিছু নাই, এমন কথা নহে।

আবহাওয়া, অনতিশীতোষ্ণ প্রদেশই গোলাপের পক্ষে ভূমি ও মৃত্তিকা। প্রকৃষ্ট, কিন্তু ইহাও বলিয়া রাখি যে, গোলাপ গাছ বত সহজে ও স্বল্পকাল মধ্যে সকল প্রকার জলবায়ু সহনক্ষম হয়, এমন বোধ হয় অপর কোন গাছ হয় না। এই যে এত জাতীয় গোলাপ আমরা দেখিতে পাইতেছি, প্রায় তাহার অধিকাংশই ইয়ুরোপ,—বিশেষতঃ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স হইতে এ দেশে প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু এ দেশে আসিয়া তাহা-দিগের যে কোন বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে তাহা বলা যায় না। সেই গাছ আসাম প্রদেশে জন্মিতেছে আবার পঞ্জাবেও জন্মিতেছে, কিন্তু এতদ্বয়ের জলবায়ুর তুলনা করিলে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, এ কথা বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। তাহা হইলেও, আব-হাওয়ার গুণে বা দোষে উহার বুদ্ধিশীলতার ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। স্বাভাবিক অল্প বারিপাতের দেশে মৃত্তিকার নিরসতা ও বায়ু মণ্ডলের শুষ্কতা নিবন্ধন তৎপ্রদেশের গাছ তেমন বুদ্ধিশীল হয় হয় না, কিন্তু ফুল সুন্দর হয়,—যেমন গঠনে, তেমনি সৌরভে। রসা-দেশে ঠিক তাহার বিপরীত হইয়া থাকে।

গোলাপের জন্ত সাধারণ জমি অপেক্ষা ঈষদুষ্ণ ভূমির আবশ্যক। বর্গায় যে স্থানে জল সঞ্চিত হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করে, এক্ষণে জমিতে গোলাপ-বাগিচা করিলে প্রতি বৎসর বর্ষাকালে অল্লাধিক গাছ মরিয়া যায়। যে সকল ভূমি নাবাল অথবা যথায় বর্ষাকালে বন্তা আসিয়া থাকে, তাহাতে গোলাপ রোপন করা উচিত নহে। ঈদৃশ জমিতে গোলাপ-



বাড়ী কলিতে হইলে সৰ্ব্বাগ্রে তাহাকে উচ্চ করিয়া লইতে হইবে। ভূমিকে উচ্চ করিবার জন্ত, উহাতে একপ মাটি দেওয়া উচিত নহে যাহাতে ক্ষেত্রের অপকার হইতে পারে। সচরাচর ক্ষেত পাথরকে উচ্চ করিতে হইলে, লোকে প্রায় বাগানের চতুর্দিকে পগার কাটিয়া কিম্বা পুষ্করিণী বা ডোবা খনন করাইয়া, তাহারই মাটি ক্ষেত্রের উপরে প্রসারিত করিয়া দিয়া থাকে। খনন কালে যদি সেই পুষ্করিণী বা পগার হইতে অত্যন্ত চট্‌চটে এটেল অথবা বালি-মাটি উঠে, তাহা হইলে সে মাটি দিলে হয়ত ক্ষেত্রের মাটি গোলাপের পক্ষে খারাপ হইয়া যাইতে পারে। ক্ষেত্রের স্বাভাবিক মাটি নিকৃষ্ট ও নিঃস্ব হইয়া থাকিলে ঈদৃশ মাটি সংশোধিত করিয়াও উহাতে অত্যধিক সার প্রদান করা প্রয়োজন। জমি অতিশয় গড়েন হইলে রুক্ষদেশে মাটি নিজ শক্তি মত বৃষ্টির জল শোষণ করিতে পারে না, অধিকন্তু একপ জমির জল বড় শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া যায়। ঈদৃশ জমিকে সোপানাবলীর দ্বারা থাক-বন্দি করিয়া লইলে ভাল হয়\*। উন্মুক্ত স্থানে গোলাপের বাগান করিতে হয়। একপ স্থানে গোলাপের বাগান বা ক্ষেত করিতে হইবে, যথায় সমস্ত দিন চৌ-চাপটে রোদ পায়, অবাধে বায়ু সঞ্চালিত হয়। গোলাপ বাগানের মধ্যে কোন বড় গাছ থাকাই উচিত নহে, এবং চারি পার্শ্বে,—বিশেষতঃ পূর্ব ও দক্ষিণ দিক সম্পূর্ণ মুক্ত থাকা আবশ্যিক। উত্তর দিকে বৃক্ষাদি বা অট্টালিকা থাকিলে কোনই ক্ষতি হয় না এবং পশ্চিম দিকে ঈষচ্ছায়া থাকিলে ‘টী’ ‘নয় মেট্’ ও ‘চায়না’ জাতীয় গোলাপ কিছু ভাল থাকে।

---

\* মংকৃত কৃষি-ক্ষেত্র দেখুন।

সকল প্রকার মাটিতেই গোলাপের আবাদ কারতে পারা যায়, কিন্তু মাটি অতিশয় এটেল বা বালুকাময় হওয়া স্পৃহনীয় নহে। পাহাড়ী জায়গায় গোলাপ বড় ভাল হয়, তাহার কারণ তথাকার মৃত্তিকা কঙ্করময়। ঈদৃশ মৃত্তিকায় স্বভাবতঃ লৌহের ভাগ কিছু অধিক থাকে। এই কারণ কলিকাতার কোন কোন পুষ্পব্যবসায়ী বৈষ্ণবনাথ, দেওঘর, মধুপুর প্রভৃতি স্থানে গোলাপের বিস্তৃত আবাদ করিয়াছেন। মৃত্তিকা লৌহসমৃদ্ধ না হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু উহা জলশোষক, জল-ধারণ ও জল-নিঃসারক হওয়া বিশেষ আবশ্যক। দো-আঁশ মাটিরই একাধারে এই তিনটী গুণ থাকিতে দেখা যায় বলিয়া এইরূপ মাটিই গোলাপের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। অনেক জমি পতিত থাকিতে দেখা যায়, এবং তাহা উলুঘাস পরিবৃত্ত। একরূপ ক্ষেত্রকে আবাদ করিতে হইলে, শীতকালে উহাকে কোদাল দ্বারা গভীররূপে কোদলাইয়া ও হলচালনাদির দ্বারা বারম্বার উত্তম করিয়া চূর্ণ করতঃ মাধ্যমত শিকড়রাশিকে বাছিয়া ফেলা আবশ্যক। অতঃপর তাহাকে তিন চারি মাস কাল অবসর দিতে হইবে। এই কার্যকে সহজসাধ্য করিবার একটী বিশেষ উপায় আছে। আশ্বিন মাসে ‘যো’ পাইছেই উত্তম করিয়া হলচলনাদির দ্বারা ক্ষেত্র তৈয়ার করতঃ খুব ঘন করিয়া রবি শস্ত বুনিয়া দিতে হয়—এরূপ করিলে উক্ত ফসল দ্বারা ক্ষেত্র ঢাকিয়া যায়, ফলতঃ উলুঘাস বা অপর আগাছা আর জন্মিতে পারে না। এইরূপ জমির পুনরুদ্ধারের জন্য মটর, কলাই, বুট, মুগ, নীল প্রভৃতির আবাদ করা প্রশস্ত, কারণ এই সকল ফসলের জবজার-জান আকর্ষণ করিয়া ক্ষেত্রকে সারবান

করিবার স্বাভাবিক শক্তি আছে। বহুকাল হইতে অবিচ্ছিন্নরূপে  
আবাদ হওয়ায় যে সব ক্ষেত্র সারহীন হইয়া পড়ে, তাহাদিগকেও  
এই প্রণালীতে উদ্ধার করিতে পারা যায়।

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

গো, মহিষ, ছাগ, মেঘ, অশ্ব প্রভৃতির মল, মূত্র, খৈল  
অস্থিচূর্ণ, নীল-সিটী, গুয়ানো ইত্যাদি নানাবিধ সার নানা লোকে  
সার।

উল্লিখিত সার সমূহের অধিকাংশই সহজলভ্য  
কিন্তু এই কয়টি সকল স্থানে অনায়াসে পাওয়া যায় না, তাহার  
মধ্যে নীল-সিটী, অস্থিচূর্ণ ও গুয়ানো প্রধান। অস্থিচূর্ণ  
কলিকাতার ত্রায় সহরে খরিদ করিতে পাওয়া যায়। ‘গুয়ানো’  
দেশান্তর হইতে আনিত হইয়া থাকে, এবং কোন কোন বীজ  
ব্যবসায়ী উহার আমদানী করিয়া থাকেন।

গুয়ানো। ইহা আমি নিজে কখনও ব্যবহার করিবার  
আবশ্যকতা অনুভব করি নাই, ফলতঃ তাহার কার্যকারিতা  
সম্বন্ধে আমার নিজের কোন অভিজ্ঞতা নাই, একথা স্বীকার  
করিতে আমি সঙ্কুচিত বা লজ্জিত নহি। ইহার উপকারিতা  
সম্বন্ধে গোলাপ পালনের অধিপতিদিগের মধ্যে মতভেদ আছে।  
বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ গোলাপপালক মিঃ উইলিয়ম পল বলেন যে  
অতি নিকৃষ্ট ও নিঃস্ব মৃত্তিকায় যে সকল গোলাপ পালিত হইয়া  
থাকে, তাহাদিগের পক্ষে ইহা ভাল সার হইতে পারে, কিন্তু  
মৃত্তিকা নির্বিশেষে রোপিত গাছই যে উহা দ্বারা উপকার লাভ

করিবে একরূপ মনে হয় না। গুয়ানো সার প্রয়োগ করিলে গাছের বৃদ্ধিশীলতার বিশেষ সহায়তা হয়, গাছের শ্রীবৃদ্ধি হয়, কিন্তু পুষ্পোৎপাদন পক্ষে কোন কাজ হয় না\*। মি রিভাস্ নামক অল্প একজন বিশিষ্ট ও বহুদর্শী গোলাপ-পালক বলেন যে, গোলাপ গাছকে অনতি কাল মধ্যে পুষ্পিত করিবার পক্ষে গুয়ানো বেশ ভাল সার। একত্ব গামলার গাছের জন্য এক পাউণ্ড (প্রায় আধসের) গুয়ানোতে কুড়ি গ্যালন জল (প্রায় দুই মণ) জল, এবং ভূমিতে রোপিত গাছের জন্য উল্লিখিত পরিমাণ জলের সহিত প্রায় এক সের গুয়ানো বিমিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়†। আবার শার্লি হিবার্ট সাহেব সার-কুড়ের জলীয় ভাগের সহিত জল মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করাই ভাল মনে করেন। এবং ইহাকেই প্রাধান্য দিয়া পরে গুয়ানোর উল্লেখ করিয়াছেন‡। ফার্মিঞ্জার সাহেব একজন ভারতীয় উদ্যানসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ইয়াও গোলাপ গাছে গুয়ানো ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন নাই। উল্লিখিত মতামত ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, খুব বেশী পরিমাণ জলের সহিত উহা ব্যবহার করিলে কাজ ইহাতে পারে কিন্তু আমি বলি যে, এত ঝঙ্কটে না গিয়া যাহা সহজপ্রাপ্য তাহাই ব্যবহার করা উচিত। গুয়ানো অতি তেজাল সার, স্মৃতরাং উহার মাত্রা অধিক ইয়া গেলে গাছ মরিয়া যায়। ফস্কেট ও য়ামোনিয়া,—এই দুইটা পদার্থ গুয়ানো মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু এই দুই জিনিস আরও অনেক

\* William Paul's The Rose Garden.

† Rivers' Rose Amateur's Guide.

‡ Shirley Hibbert's The Amateur's Greenhouse.

জিনিসে পাওয়া যায় । সুতরাং প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জের  
গুয়ানোপক্ষীর বিষ্ঠার জন্ত ব্যগ্র হইবার প্রয়োজন নাইঃ ।

সচরাচর ব্যবহারের জন্ত গোবর-সারই স্পৃহনীয়, কারণ ইহা  
সহজেই পাওয়া যায় সুতরাং সকলেরই আয়ত্তাধীন । এই

সার যত্ন পূর্বক তৈয়ার করিতে পারিলে  
গোবর সার ।

উদ্ভিদের পক্ষে বড়ই উপাদেয় হয় ।

গোবরের সহিত চোনা ( মূত্র ) মিশ্রিত করিয়া কিছু দিন একটা  
ইষ্টক নিষ্পিত চৌবাচ্চায় কিম্বা বড় বড় পিপার (Barrel) মধ্যে  
সঞ্চিত করিয়া এবং তাহাতে অল্প পরিমাণে জল দিয়া রাখিলে  
অতি উৎকৃষ্ট সার হইয়া থাকে । চৌবাচ্চা হউক বা পিপা  
হউক, যাহাতে সার সঞ্চিত হইবে তাহা দিব্যাত্র আবৃত থাকা  
আবশ্যক । একাদিক্রমে ঢাকিয়া রাখিলে তাহার মধ্যে অধিক  
উত্তাপ জন্মিয়া গুণবতীর হ্রাস করিয়া থাকে । অধিক দিন  
ধরিয়া সার পচিতে থাকিলে, উহা পাকের মত হইয়া যায় এবং  
সে অবস্থায় উহার অন্তর্গত গ্যামোনিয়া নামক অত্যাবশ্যকীয়  
পদার্থেরও হ্রাস প্রাপ্তি ঘটে । যাহা হউক সারের অবস্থা রক্ষা  
থাকিলে ব্যবহৃত হইবার পূর্বে উহার সহিত আবশ্যক মত শুষ্ক  
নাটি বা বুয়া গোবর উত্তমরূপে মিশাইয়া লওয়া উচিত ।

ছাগ ও মেঘের নাদি ( বিষ্ঠা ) যে বিশেষ ফলপ্রদ তাহা

আমার মনে হয় না, কিন্তু ব্যবহার করার কো-  
মেস ও ছাগল নাদি ।

নও ক্ষতি নাই, কিছু উপকার পাওয়া যায়ই ।

অশ্বের বিষ্ঠা বড় তেজস্কর সার, সুতরাং উহার টাটকা

---

ঐ প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জে গুয়ানো নামক যে পক্ষী আছে তাহারই  
বিষ্ঠাকে গুয়ানো-সার বলে ।

ব্যবহারে বড়ই ক্ষতি হইয়া থাকে। একস্থানে উহা কয়েক দিন সঞ্চিত হইয়া থাকিলে অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া আত্মাবলের আধ্বজ্ঞান। উঠে এমন কি উহা হইতে বাষ্প উদ্গীর্ণ হইতে থাকে। ঈদৃশ সার গাছের গোড়ায় দিলে গাছ মরিয়া যায়। ব্যবহার করিতে হইলে উহাকে উত্তমরূপে পচাইয়া লইতে হইবে। নবরোপিত কিসা শীর্ণ গাছে অশ্বপুত্রীষ দেওয়া আদৌ উচিত নহে।

সকল প্রাণীরই বিষ্ঠা অপেক্ষা মূত্র অধিক তেজস্কর। মূত্রকে তরল সাররূপে ব্যবহার করিতে হইলে গামলায় অথবা কেরোসীন-টিনের মধ্যে আবদ্ধ করতঃ কয়েক মূত্র। দিন রাখিলে উহা অতি উত্তম উত্তেজক সার হইয়া উঠে। এই প্রণালীতে পচিত মূত্রের সহিত চারি পাঁচ গুণ জল মিশাইয়া গাছের গোড়ায় ঢালিয়া দিতে হয়। টাটকা মূত্র ব্যবহার করিতে হইলে, তাহার সহিত আট দশ গুণ জল মিশ্রিত করা আবশ্যক।

গোলাপ গাছের জন্ত গোবর যেরূপ সাধারণ সার, খৈলও তদনুরূপ। অপরাপর খৈল অপেক্ষা সর্বপ খৈলই সমধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং এতদ্বারা খৈল। বিশেষ উপকারও পাওয়া যায়। সাধারণতঃ লোকে প্রায় খৈল না পচাইয়া সত্ত্ব গাছের গোড়ায় দিয়া থাকে, কিন্তু আমি ইহার পক্ষপাতী নহি, কারণ গাছের গোড়ায় খৈল পড়িলে, মাটি হইতে রস শোষণ করিয়া উহা ফুলিয়া উঠে, পরে উত্তপ্ত হয়। এইরূপে উত্তপ্ত হইলে তবে উহা পচিতে থাকে, কিন্তু উত্তপ্ত অবস্থাতেই উহা গাছকে অনেক সময় মারিয়া ফেলে।

টাটকা প্রাণীজ সার ব্যবহারে যে দোষ, সন্ধ্যা খৈল ব্যবহারেও সেই দোষ ঘটে। খৈল আট দশ দিন মধ্যেই পচিয়া গিয়া ব্যবহারোপযোগী হয়। খৈল পচাইবার জন্ত বড় মাটির জায়গা বা পিপে ব্যবহার করা উচিত।\* পচা খৈলের সহিত অর্দ্ধভাগ শুষ্ক বা ঝুরা গোবর সার, কিম্বা সিকিভাগ ঝুরা মাটি মিশ্রিত করিয়া লওয়া উচিত।

অস্থিচূর্ণ ব্যবহার এদেশে বড় কম, কিন্তু ইহার ত্রায় অমূল্য সার নাই বলিলে অতুক্তি হয় না। ইহা যে ভূমীলা সামগ্রী

তাহা নহে, তবে সকল স্থানে পাওয়া যায় অস্থিচূর্ণ।

না। কলিকাতায় গ্রেহাম কোম্পানীর আপিসে পঞ্চাশ টাকায় প্রতি টন (সাড়ে সাতাইশ মণ) হিসাবে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। খৈলের ত্রায় অস্থিচূর্ণকে গামলা, পিপে বা টিনের কানাস্রার মধ্যে রাখিয়া জ্বল দিতে হয়। এই অবস্থায় তিন চারি মাস থাকিলে উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে। অস্থি-চূর্ণকে জলে ভিজাইবার সঙ্গে উহাতে সমপরিমাণ প্রাণীজ সার বা উদ্ভিজ্জ

\* যে কোন উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ সার ব্যবহার করা হউক, তাহাকে পচাইয়া লইলে উহার গরম কাটিয়া যায় সুতরাং তখন গাছের গোড়ায় সেই সার দিলে গাছের কোন ক্ষতি হয় না। সার অধিক পচিয়া গেলে উহা অকর্ষণীয় হইয়া যায়, এজন্য অর্দ্ধ-পচিত সারই ব্যবহার্য। জমিতে গর্ভ করিয়া তৎক্ষণাৎ সার ফেলিয়া কিম্বা ক্ষেত্রের উপরেই কোন অনাবৃত স্থানে সার সঞ্চিত করিয়া রাখিবার কিছু দিন পরে ব্যবহার করিলে সারের সারত্ব বহু পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়। সার তৈয়ার করিবার প্রণালী মৎপ্রণীত কৃষিক্ষেত্রে বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে।

সার মিশাইয়া দিলে অস্থিচূর্ণ শীঘ্র পচিয়া যায় এবং সারও অতিশয় ফলপ্রদ হইয়া থাকে । যাহা হউক অস্থিচূর্ণ পচিয়া গেলে, পাত্র হইতে উঠাইয়া উহার প্রতি মণের সহিত আধ-পচা গোবর পাঁচ ছয় মন, কিম্বা আধ পচা সর্বপ খৈল ও তিন চারি মণ মৃত্তিকা উত্তমরূপে মিশাইয়া লওয়া আবশ্যক, নতুবা অস্থিচূর্ণ সারের তেজস্করতা হেতু গাছ ষাঁড়াইয়া যাইতে পারে\* । ষাঁড়াইয়া গেলে গাঁছের ফলন-ফুলনের আশা থাকে না । বিগত কয়েক বৎসর হইতে অস্থি-গলিত সার আমি প্রায় বার মাসই বহু প্রকারের ফলের, ফুলের ও তরিতরকারির-গাছে ব্যবহার করিয়া আসিতেছি । এইরূপ ব্যবহারে আশাতীত ও আশু ফল প্রাপ্ত হই বলিয়া আমি ইহার একান্ত পক্ষপাতী । এ স্থলে-বিশেষরূপে বলিয়া রাখি যে অস্থিচূর্ণ হইতে আশু ফললাভ করিতে হইলে উহাকে উত্তমরূপে পচাইয়া লইতে হইবে, নতুবা উহার ফল অতি ধীরে হইয়া থাকে । সম্বন্ধ বিশেষে ও প্রয়োজন মত আমি উহার তরল-সারও ব্যবহার করিয়া থাকি ।

গলিত পদার্থের সহিত জল মিশ্রিত করিয়া যে জলীয় সার প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে তরল-সার বলে ।  
তরল-সার । প্রাণীগণের মল-মূত্র, খৈল প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ পদার্থের অর্দ্ধ গলিতাংশের সহিত, কিম্বা গলিত অস্থি-চূর্ণের সহিত জল মিশ্রিত করিয়া তরল-সার প্রস্তুত করিতে হয় । শুষ্ক-সার অপেক্ষা তরল-সার প্রয়োগ করিলে, অনতিকাল

---

\* উদ্ভিদের অপরিমিত বৃদ্ধিগীলতাকে গ্রাস্যভাষায় ষাঁড়াইয়া বাওয়া কহে ।



মধ্যে, এমন কি সাত আট দিন মধ্যে, গাছে বসান হয়—গাছের প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে শাখা উদ্গত হয়। এই কারণে তরল-সার অধিক পরিমাণে দেওয়া উচিত নহে। গাছের গোড়া হইতে নূতন কাণ্ড কিম্বা অবস্থিত মূল কাণ্ড সমূহ হইতে উপ-শাখা অতিরিক্ত সংখ্যায় উদ্গত হইলে উৎপত্তির সংখ্যাধিক্য হেতু গাছ তেমন ঝাড়াল হয় না এবং তৎসমুদায় তাদৃশ তেজাল বা বড় না হইয়া শীর্ণ ও অদীর্ঘ হইয়া থাকে, ফলতঃ ফুল অধিক হইলেও, তাহার গঠন তেমন ঘন এবং আকার তেমন বড় হয় না। একদিকে তরল-সার যেমন অধিক দেওয়া উচিত নহে, অল্প দিকে তেমন ফুল হইবার অধিক পূর্বে দেওয়াও উচিত নহে। গাছে ফুল আসিবার বহু পূর্বে তরল-সার প্রদত্ত হইলে, সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা। এজন্ত বিশেষ বিবেচনা সহকারে তরল-সার প্রয়োগ করা উচিত। ফুল আসিবার উপক্রম দেখিয়া, গাছে তরল-সার দিলে, ফুল বড়, ফুলের পাপড়ীর সংখ্যা অধিক ও আকার বড় হয় এবং ফুলের বর্ণ অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল হয়।

সোরা গুঁড়াইয়া কিম্বা জলে গুলিয়া গোলাপ গাছে ব্যবহার করিলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। সোরা-চূর্ণ ব্যবহার

করিতে হইলে গাছের অবস্থা ও মৃত্তিকার শক্তি

সোরা।

বুঝিয়া প্রত্যেক গাছে আধ ছটাক হইতে এক ছটাক যথেষ্ট। গাছ অতি ছোট কিম্বা শীর্ণ হইলে অল্প পরিমাণে, এবং পুরাতন গাছ হইলে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে দেয়। অতিশয় তেজাল গাছে, কিম্বা সারবান ক্ষেত্রে সোরা প্রয়োগ করিতে নাই, কারণ তাহা হইলে গাছ ঝাঁড়াইয়া যাইবার সম্ভাবনা। নিঃস্ব মাটিতে সোরা দিলে উপকারই

পাওয়া যায়। গাছে সোরা প্রদান করিলে, ফল অতি শীঘ্রই পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার কার্য দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে, একজন্ম সোরা অপেক্ষা অপঘাপর সার ব্যবহার করা ভাল। ফুলের উৎকৃষ্টতা সাধনের জন্ম গাছে কুঁড়ি দেখা দিলে, তরল সোরা-সার দিতে হয়, ইহাতে ফুল বড় হয়, ফুলের বর্ণ অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল হয়।

পথ ঘাট বা মাঠ ময়দান হইতে মাটি সমেত ঘাসের চাপড়া জুলিয়া আনিয়া ইষ্টকের পাঁজার আকারে স্তরে স্তরে সাজাইয়া চাপড়া-পোড়া।

অর্দ্ধ বিদগ্ধ করিয়া লইবার পরে, তাহাকে চূর্ণ করিয়া লইলেই চাপড়া-পোড়া প্রস্তুত হইল। পাঁজার আকার দীর্ঘে, প্রস্থে ও উচ্চতায় তিন কিয়া চারি ফুটের অধিক হওয়া উচিত নহে। প্রত্যেক দুই স্তরের মধ্যে শুষ্ক ডাল-পালা একস্তর করিয়া সজ্জিত করিয়া দিতে হয়। অনস্তর পাঁজার উপরিভাগ ও চারি পার্শ্ব মাটি ও গোবর দ্বারা লেপিয়া দিয়া নিম্নে আশ্বন লাগাইয়া দিতে হয়। আশ্বন বাহাতে জলিয়া না উঠে সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। জলিয়া উঠিলে বা জলিবার উপক্রম দেখিলে জলের ছিটা দিয়া তাহা নির্দোষ করিয়া দিতে হইবে। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে অথবা অধিক দগ্ধ হইলে চাপড়ার মাটি ইষ্টকের ছায় বর্ণ ধারণ করে, ফলতঃ তাহাতে দাছ পদার্থ কিছুই থাকে না। মাটি অর্দ্ধ দগ্ধ হইলে প্রকৃত চাপড়া-পোড়া হইয়া থাকে। চাপড়ার পাঁজা পোড়াইতে তিন চারি ঘণ্টা সময় লাগে। অতঃপর পাঁজা ভাঙ্গিয়া ঠাণ্ডা করিয়া চাপড়া ও কমলা বাহা কিছু থাকে, তৎসমুদায়কে একটা স্তূপ করিয়া তাহার মধ্যস্থলে একটা গর্ত

করতঃ সমুদ্র পরিমাণে জল ঢালিয়া দিতে হয়। এই অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া দিলে উক্ত স্তূপের মাটি সমুদায় জল শোষণ করিয়া লইবে। এক্ষণে উত্তমরূপে উলট পালট করিয়া লইলেই উহা ব্যবহারোপযোগী হইল। এই চূর্ণের সহিত তিন চারি গুণ মাটি মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। প্রত্যেক গাছে আধ সের হইতে এক সের দিতে পারা যায়।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, যে সকল জেলায় নীলের আবাদ হইয়া থাকে, সেই সকল স্থানেই উহা প্রাণী কিন্তু অপর স্থানে উহা

নীল সিটী। পাওয়া যায় না। নীল-সিটী বেহারে পাওয়া

যায়। রাজনগরের অতি সন্নিকটে একটা

নীলকুটি থাকায় আমি কতকগুলি করিয়া সিটী আনাহঁতাম।

• উই তিন বৎসর আমি গোলাপ ও আম্র গাছে ব্যবহার করিয়াছি।

গাছের গোড়ায় নীল-সিটী দিলে গাছ যে বড় বেগী বাড়ে তাহা

মনে হয় না, তবে গাছের পত্র সমূহের বর্ণ বেশ ঘন হইয়া থাকে

এবং ফুলের বর্ণও বেশ উজ্জ্বল হয়। কিন্তু নীল-সিটী যে গাছে

দিয়াছি উহাতেই উই লাগিয়াছিল এবং অনেক গাছকে উই-

পোকায় এক রাত্রি মধ্যে নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। উই-পোকা

গাছের মূল কাটিয়া দিত, গাছের উপরিভাগে উঠিতে দেখি নাই।

এই জন্য আমি আর উহা আদৌ ব্যবহার করি না।\*

নীলের মরসুমে অর্থাৎ আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন

\* ক্ষেত্র হইতে নীলের গাছ কাটিয়া আনিবার পরে, তৎসমুদায়কে পচাইয়া নীল বাহির করিয়া লওয়া হয়। অবশিষ্ট যে সকল ডাল-পালা থাকে তাহা পুনরায় নীলের ক্ষেত্রে সাররূপে প্রদানিত করিয়া দেওয়া হয়। এই সকল ডাল-পালাকে 'সিটী' বলে।

মাসে যখন নীলকুটীতে নীল প্রস্তুত হয়, সেই সময়ে নীলকুটী  
ইহাতে রাশি রাশি নীলের জল বহিকৃত  
নীলের-জল ।

করিয়া • দেওয়া হয় । এই জল ঘন ও ঘোর  
নীল বর্ণের । এই জল সংগ্রহ করিয়া তাহাতে ৪।৫ গুণ  
জল মিশ্রিত করিয়া গাছের গোড়ায় তরল সাররূপে ব্যবহার  
করিতে পারিলে গাছ বুদ্ধিশীল হয়,—ফুল ও ফল হইয়া থাকে ।

বিল, ডোবা ও পুষ্করিণীর জল কার্তিক মাস হইতে ক্রমে  
বত শুক হইতে থাকে, তত'তাহাদিগের পার্শ্বদেশ,—ক্রমে  
তলদেশ পর্য্যন্ত তত জাগিয়া উঠে । এই  
পাক মাটি ।

সকল স্থানের মাটি কাটিয়া আনিয়া অল্পাধিক  
পরিমাণে গাছের গোড়ায় দিলে, গাছ সকল অল্পদিন মধ্যে  
তেজাল হইয়া উঠে এবং তাহাতে প্রচুর ফুল হইয়া থাকে ।

### তৃতীয় অধ্যায় ।

ভরা-বর্ষা ও গ্রীষ্মকাল ব্যতীত অপর সকল সময়েই গোলাপ-  
গাছকে ভূমিতে রোপন করিতে পারা যায় । উল্লিখিত দুই  
সময়ে যে গোলাপ গাছ কেন ভূমিতে রোপন  
রোপনের সময় ।

করা যায় না, তাহার কারণ আছে । গ্রীষ্ম-  
কালের প্রথর উত্তাপ বশতঃ নব-রোপিত গাছ অতি কষ্টেই  
জীবিত থাকিতে সমর্থ হয়, অনেক সময়ে মরিয়া যায় । বর্ষা-  
কালে ভূমিতে গাছ রোপন করিবার পক্ষে আপত্তি এই যে,  
সে সময়ে মাটি অত্যন্ত ভিজা বা কাদাটে থাকে, তন্নিবন্ধন  
গাছকে সূচাৰুৰূপে ভূমিতে রোপন করিতে পারা যায় না ।

যে সময়ে মাটি শুক অথচ ঈষৎ রসা থাকে, গাছ রোপনের পক্ষে তাহাই উৎকৃষ্ট সময়। ঈদৃশ মৃত্তিকা সহজেই চূর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং এরূপ সময়ে রোপন করিলে, রোপিত বৃক্ষ অনতিকাল মধ্যেই মৃত্তিকায় সংলগ্ন হইয়া গিয়া নূতন নূতন মূল চারিদিকে প্রসারিত করিতে থাকে ও উপরিভাগে নবপল্লবে সুশোভিত হইয়া উঠে। মাটির অবস্থা কাদাটে থাকিলে, রোপনের ক্ষমতা গঠন কালে তদভ্যন্তরস্থিত তাবৎ মাটি চাপ বাধিয়া যায়, ফলতঃ উত্তমরূপে গাছ রোপিত হয় না, পরে সেই সকল মাটির চাপ ক্রমে হয়ত কঠিন হইয়া যায় ও তাহাতে নবরোপিত বৃক্ষের বৃদ্ধিশীলতার ব্যাঘাত ঘটায়।

গোলাপ গাছ রোপনের পক্ষে কার্তিক মাসের প্রথমভাগ হইতে পৌষ মাসের শেষ পর্য্যন্ত—এই তিন মাস অতি উত্তম সময়। এই সময়ে মাটি বেশ রসা থাকে, অথচ বর্ষার ভয় থাকে না, দিবা ভাগ ছোট ও রাত্রি কাল দিন দিন বড় হইতে থাকে,—তজ্জন্ত সূর্য্যের উত্তাপ সে সময়ে প্রথর না হইয়া মধুর হইয়া থাকে। তাহা ব্যতীত শিশিরপাত হেতু রোপিত বৃক্ষ প্রত্যাহই ম্রাত হয়। উল্লিখিত কারণে এই সময়ই গোলাপ রোপন করা উচিত। অতঃপর মধ্যম সময় মাঘ ফাল্গুন মাস। এ সময়ে দিন ক্রমশঃ বড় ও রাত্রি ছোট হইতে থাকে, রৌদ্রের প্রথরতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার অন্তর্দিন মধ্যেই গ্রীষ্মকাল আসিয়া পড়ে, সুতরাং গাছে সমধিক পরিমাণে জল সেচন করিবার প্রয়োজন হয়। উক্ত কয়েক মাসের মধ্যে যাহারা গোলাপ রোপন করিতে সমর্থ না হয়েন, তাঁহাদিগকে অগত্যা গ্রীষ্ম বা বর্ষাকালে রোপন করিতে হয়। গ্রীষ্ম ও

বর্ষাকালে রোপন না করিয়া বরং জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে কিম্বা  
আষাঢ় মাসের প্রারম্ভে ছুই এক পসলা বারিপাত হইলে, এক  
দফা গোলাপ গাছ রোপন করিতে পারা যায়।

বিস্তৃত ক্ষেত্রে, বা বহুসংখ্যক গাছ রোপন করিতে হইলে  
শেষোক্ত সময় উত্তান-স্বামীর পক্ষে সুবিধাজনক হইতে পারে  
কারণ বহুসংখ্যক গাছ রোপন করিয়া, কৃত্রিম উপায়ে বহুদিন  
যাবৎ সেই সকল গাছে জল সেচন করিতে হয় না।

শীতকালে গোলাপ রোপনের সপক্ষে আর একটা বিশেষ  
যুক্তি আছে। সচরাচর সকলকে দূরদেশ হইতে গাছ আনা হয়  
রোপন করিতে হয়। শীতকালে আনা হইতে পারিলে গাছ  
বড় বেশী মরে না কিন্তু গ্রীষ্মকালে আনা হইলে পথে আসিতে  
আসিতে এবং যথা স্থানে আসিয়া পৌছিয়া শুকাইয়া বা  
মরিয়া যায়।

চালানী গাছ সচরাচর বায়ু মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আইসে,  
তন্নিবন্ধন কয়েক দিবস উহারা বায়ু ও আলোক সম্মুখে বঞ্চিত  
থাকে, ফলতঃ উহাদিগের প্রকৃতি কিছু  
চালানী গাছ। পরিবর্তিত হইয়া যায়। এইজন্য বিদেশ হইতে  
গাছ আসিয়া পৌছিলে, তৎপর তাহাদিগকে ভূমিতে রোপন  
না করিয়া, বায়ু ও রোদ্দ সহনে ছুই একদিন অভ্যস্থ করিয়া  
লইবার পরে, রোপন করিতে পারিলে ভাল হয়। অল্পাধিক  
দিন আবদ্ধাবস্থায় থাকিবার পরে সহসা আলোকাতির সংস্পর্শে  
আসিলে সকল না হউক—কতকগুলি গাছ ঝাঁপ খাইয়া মরিয়া  
যাইবার সম্ভাবনা। রোদ্দের তেজে গাছ ঝলসিয়া গেলে ঝাঁপ  
খাওয়া বলে। চালানী গাছ আসিয়া পৌছিলে উহার আবরণ

উন্মোচিত করিয়া ছায়াযুক্ত বায়ুপ্রবাহিত স্থানে ছয় সাত ঘণ্টা রাখিবার পরে গাছগুলির উপরে ঈষৎ জলসেচন করিতে হয়। এতদ্বারা উদ্ভিদ স্নাত ও বিধৌত হয়। এ অবস্থায় গাছের গোড়ায় জল দিবার বড় আবশ্যক হয় না কারণ গোড়া প্রায় সিক্ত থাকে। অতঃপর অপরাহ্নে বাল্মসমেত গাছগুলিকে বহির্দেশে আনিয়া সমস্ত রাত্রি তদবস্থায় রাখিয়া, প্রাতে নব্ব দশ ঘটিকার সময় পুনরায় ঈষচ্ছায়া স্থানে রাখিতে হইবে কিম্বা তদুপরে কোন আচ্ছাদন দিতে হইবে। অতঃপর দুই এক দিন পরে অপরাহ্নে উহাদিগকে ষষ্ঠাংশে রোপন করিতে হইবে। ইতিমধ্যে যদি বৃষ্টি হইয়া মাটি অতিশয় রসিয়া গিয়া থাকে অর্থাৎ ভূমি খনন করিলে মাটি কাদাটে হইয়া যাইবার সম্ভবনা থাকে, তাহা হইলে যাবৎ মাটিতে পুনরায় না 'ষো' হয় তাবৎকাল অপেক্ষা করিতে হইবে। ইহাদিগের মধ্যে যে সকল গাছ বান্ খাইয়াছে, তাহাদিগকে একবারে নির্দিষ্টস্থানে স্থায়ীরূপে রোপন না করিয়া, আপাততঃ কিছুদিনের জন্ত চারা-বাড়ীতে কিম্বা কোন অনতিরোদ্ধ স্থানে রাখিলে বা হাপোর দিতে পারিলে অস্বাভিক কাল মধ্যে উহারা সামলাইয়া উঠিতে পারে।—যাহা হউক, রোপন করিবার পূর্বে প্রত্যেক গাছের শুষ্ক ও শীর্ণ শাখা প্রশাখা কাটিয়া ফেলা এবং অবশিষ্ট শাখাগুলির গোড়া হইতে ছয় বা আট অঙ্গুলি রাখিয়া উপরিভাগ ছাঁটিয়া দিতে হইবে। শাখা দীর্ঘ ও বহুসংখ্যক থাকিলে গাছ ঝিমাইয়া পড়ে, কারণ নবরোপিত উদ্ভিদ আপাততঃ কয়েক দিন স্ব স্ব অবয়বকে গোষণ করিবার উপযোগী পদার্থ ভূমি বা বায়ুমণ্ডল হইতে আহরণ করিতে

সমর্থ হয় না, অপরন্তু রোদ্র ও বাতাসের দ্বারা বহু পরিমাণ রস আকর্ষিত হইয়া, উদ্ভিদকে দুর্বল করিয়া ফেলে। কিন্তু উল্লিখিত প্রণালীতে গাছের ডাল ছাঁটিয়া দিলে সে আশঙ্কা থাকে না বরং সেই সকল অংশ কর্ত্তিত হওয়ার, উদ্ভিদের শক্তি অবশিষ্টাংশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নিযুক্ত হইয়া থাকে।

গোলাপ গাছ রোপন করিতে হইলে তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে কতটা স্থান ব্যবধান থাকা উচিত তাহা স্থির করিবার জন্ত কয়েকটা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বৃক্ষ পরস্পরে ব্যবধান। হইবে। গোলাপের ছোট বড় অনেকগুলি বিভাগ আছে এবং প্রত্যেক বিভাগেই অল্প বা অধিক সংখ্যক জাতির গোলাপ আছে। প্রত্যেক বিভাগের জাতি সমূহের মধ্যে পরস্পরের প্রাকৃতিক সামঞ্জস্যতা বহু পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু এক বিভাগের সহিত অপর বিভাগের তুলনা করিলে অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। হাইব্রিড-পার্পেচুয়াল (Hybrid perpetual), টী (Tea-scented), নয়েসেট্ (Noisette), বোবুর্বো (Bourbon), মস্ (Moss), ডামাস্ক (Damask), চায়না (China) প্রভৃতি কয়টি বিশেষ উল্লেখ যোগ্যবিভাগ। জাতি নির্বিশেষে একই ক্ষেত্রে বা কেয়ারিতে নানা জাতির গোলাপ রোপিত হইলে বৃদ্ধিশীল, দীর্ঘ-শাখী ও লতিকাস্বভাব গাছগুলি দ্বারা অপেক্ষাকৃত কোমলস্বভাব ও ক্ষুদ্র জাতীয় গাছগুলি অল্পদিন মধ্যেই ঢাকিয়া যায়, তন্নিবন্ধন শোষোক্ত জাতির গাছ সমূহ বায়ু ও আলোকাভাবে এবং ঘনতাবশতঃ শুশুম্নলে বর্ধিত হইবার সুবিধা পায় না, সুতরাং ঈদৃশ গাছ হইতে



পুষ্প পাইবার প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। প্রত্যেক বিভাগীয় গোলাপের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন চোকা বা গটী বা কেয়ারি রচনা করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগীয় গোলাপদিগকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানে রোপন করিলে আরও একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, সাময়িক সেবার জন্ত উত্তানস্বামী বা উত্তানপালকে বিব্রত হইতে হয় না। প্রত্যেক বিভাগের গোলাপের সাময়িক পাটের জন্ত সময় নির্দিষ্ট আছে। সকল শ্রেণীর গোলাপ একত্রে থাকিলে বাছিয়া প্রত্যেকটাকে স্বতন্ত্রভাবে সেবা করা বড় কঠিন ব্যাপার। হাইব্রিড-পার্পেচুয়াল, মস, ও ডামাস্ক জাতির অনতিবৃদ্ধিশীল গাছকে তিন ফুট এবং উহাদিগের মধ্যে যাহারা বৃদ্ধিশীল, তাহাদিগকে চারি ফুট অন্তর রোপন করা উচিত। টী জাতীয় গাছ সকল হইতে সমূহ পরিমাণে শাখা প্রশাখা উৎপন্ন হয় এবং এই সকল গাছ উর্দ্ধে অধিক উচ্চ না হইয়া পার্শ্বদেশেই প্রসারিত হয় এজন্ত ইহাদিগের প্রত্যেকের জন্ত চারি ফুট হইতে পাঁচ ফুট স্থান দিতে হয়, কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে যাহারা অধিক প্রসারক তাহাদিগকে ছয় ফুট স্থান দেওয়া আবশ্যক হয়। নরসেট জাতীয় গাছগুলি লতিকাপ্রকৃতি, সুতরাং তাহাদিগকে একুণ স্থানে রোপন করিতে হয় যথায় তাহারা কোন অবলম্বন পাইয়া অনায়াসে অনেক দূর অবধি বিস্তৃত হইতে পারে। মার্শাল-নীল, ক্লথ-অব-গোল্ড লা-মার্ক প্রভৃতির ফুলের পরিমাণ যেমন অধিক হয়, তেমনি গাছের শ্রী ও মনোহর। বিস্তৃত তৃণ-বীথিকা (Lawn) মধ্যে দূরে দূরে কিম্বা দ্বীপদ্বীপ প্রত্যেক গাছের জন্ত একটি করিয়া কেয়ারি করিয়া দিলে, সেই সকল কেয়ারির গাছ অবাধে

বিস্তৃতি লাভ করিতে সমর্থ হয়। নানাবিধ গঠনের জাকরিতে  
কিধা প্রাচীরের গাত্রে কিধা কোন স্তম্ভের সহিত সংযুক্ত করিয়া  
দিলে তাহারা সেই অবলম্বনকে ক্রমে সুন্দররূপে ঢাকিয়া ফেলে  
তখন দেখিতে বড় সুন্দর হয়। তবে কোন কেয়ারি মধ্যে  
কতকগুলিকে একত্রে রোপন করিতে হইলে প্রত্যেকের জন্য  
চারি পার্শ্বে ৮।১০ ফুট স্থান থাকা প্রয়োজন। (Province)  
প্রভিন্স ছোট জাতীয় গাছ—কদাচ দুই ফুট উচ্চ হয়। ইহাদিগকে  
উদ্ভানের পথিপার্শ্বস্থ হাঁসিয়া (border) মধ্যে দেড় বা দুই  
ফুট অন্তর রোপন করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত হাইব্রিড্-  
পার্পেচুয়াল বিভাগের মধ্যে ডিভোনিয়েন্সিস্ (Devoniensis),  
জুলস-মার্গটিন (Jules margottin), টী বিভাগের রেণি-ডি-  
হেন্‌রিয়েট, (Reine-de-Henriette) প্রভৃতি লতানিয়া  
গোলাপের অন্ত নয়সেট্ জাতীয় গোলাপের মত স্থান দিতে  
হইবে।

গোলাপের শত শত জাতি আছে, কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকটী  
চিনিয়া রাখা বড় কঠিন কথা। বাহারা সর্বদা গোলাপ লইয়া  
ব্যাপৃত আছেন, তাহারা কেবল গাছ দেখিয়া উহাদিগের নাম  
বলিতে পারেন, কিন্তু কিছু দিন গোলাপ গাছের চর্চা করিলে  
কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গোলাপ গাছকে চিনিয়া রাখিতে  
পারা যায়। সকল গোলাপ গাছকে চিনিতে না পারিলে তত  
ক্ষতি হয় না কিন্তু কোন গাছটী কোন বিভাগের অন্তর্গত সে  
বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করা উচিত।  
একটু সূক্ষ্মদর্শন থাকিলেই সে বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারা যায়।  
গাছ রোপিত হইবার পরে, জল সেচন করিতে হয়।

জল সেচন করিবার ২১ দিন পরে ক্রমে মাটি ফাটিতে থাকে, তন্নিবন্ধন মাটির ভিতরে আলোক, বাতাস ও গাছের গোড়া ঢাকা। রৌদ্র প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু মূল এ সকল চাহে না—ইহাতে গাছের অনিষ্ট হয়। এই অনিষ্টাশঙ্কা বিদূরিত করিবার জন্য এবং মৃত্তিকাকে শীতল বা সিক্ত রাখিবার জন্য গাছের গোড়ায় থালা বা আলু বাঁধিয়া তাহাতে দুই তিন অঙ্গুলি পুরু করিয়া যে কোন অর্ধ বিগলিত (half-rotten) সার বিস্তারিত করিয়া দিতে হয়। এই পদ্ধতিকে ইংরাজিতে মলচিং (mulching) কহে। এইরূপে গাছের গোড়া ঢাকিয়া দিলে অনেক উপকার পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে আরও কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। গাছের গোড়া ঢাকিয়া দিলে মৃত্তিকার ছিদ্রপথ সমূহ ক্রিয়াশীল থাকে, ফলতঃ সূর্য্যাস্থির আকর্ষণে প্রতিনিয়ত ভূগর্ভ হইতে রস উপরিভাগে আসিতে থাকে, তন্নিবন্ধন উদ্ভিদের রসাতাব হয় না। অতঃপর, ছিদ্রপথ সমূহের মুখ মুক্ত থাকায় জল সেচন করিলে বা বারিপাত, হইলে তাবৎ জলই অবিলম্বে মৃত্তিকা মধ্যে শোষিত হইয়া যায়। এই-রূপ গোড়া ঢাকিবার জন্য গৃহস্থ বাড়ীর আবর্জনা কিম্বা ছাইও ব্যবহার করিতে পারা যায়, কিন্তু যে কোন সামগ্রী ব্যবহৃত হউক, তাহা অতিশয় গলিত কিম্বা ধূলিবৎ শুড়া না হইয়া দানাদার ও স্থূল হইলে ভাল হয়। গলিত বা সূক্ষ্ম চূর্ণ পদার্থ প্রয়োগ করিলে উহা শীঘ্রই মাটির সহিত মিশাইয়া যায়, সুতরাং তত ফলপ্রদ হয় না। গাছের গোড়া ঢাকিয়া দিবার প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াও, উল্লিখিত আবর্জনা বা সার ক্রমে বিগলিত হইয়া মৃত্তিকা মধ্যে প্রবেশ লাভ করতঃ তরল সারের

কার্য্য করে, তদ্বারা 'উদ্ভিদগণ তেজাল হইয়া উঠে'। কেবল যে নবরোপিত গোলাপের জন্ত এই ব্যবস্থা তাহা নহে, যে কোন গাছের জন্তই এবং যখন তখন এ প্রণালী অবলম্বন করিতে পারা যায়।

রোপন করিবার পূর্বে ক্ষেত্র, কেয়ারি বা পটি,—যেস্থানে গাছ রোপন করিতে হইবে, কার্য্যের সুশৃঙ্খলা ও উত্তানের রোপন প্রণালী।

মোট নক্সা অঙ্কিত করতঃ, কোন গাছটী কোথায় রোপন করিতে হইবে,—প্রত্যেক গাছ কতদূর অন্তর বসিবে ইত্যাদির নির্দ্ধারণের জন্ত উক্ত নক্সাতে চিহ্ন দিয়া রাখিলে কার্য্যকালে কার্য্যের শৃঙ্খলা হয়,—সময়েরও অনেক সাশ্রয় হয়। অনন্তর সেই নক্সার চিহ্ন অনুসারে ভূমিকে চিহ্নিত করিয়া, চিহ্নিতস্থানে একটা করিয়া দুই ফুট ব্যাস ও দুই ফুট গভীর গর্ত খনন করিতে হইবে। মাটি আলগা ও সারাল হইলে গর্তের আয়তন ছোট করিলে চলিতে পারে। অনন্তর গর্ত হইতে উত্তোলিত মাটিকে দুই একদিন প্রসারিত করিয়া রাখিবার পরে মুদগর বা খুরপির দ্বারা চূর্ণ করতঃ সেই মাটির সহিত সমপরিমাণ স্থূল সার মিশ্রিত করিতে হইবে এবং তাহা হইতে তৃণাদির শিকড় ও ইট-পাটকেল বাছিয়া ফেলিতে হইবে। এই সকল প্রাথমিক কার্য্য সমাধা করিয়া পরিস্কার দিনে অপরাহ্ন কালে নির্দিষ্ট স্থানে এক একটা গাছ রোপন করিতে হইবে। উত্তোলিত মাটি নিতান্ত শুষ্ক হইয়া থাকিলে কিঞ্চিৎ জল সেচন করতঃ মাটিকে উত্তমরূপে উলট-পালট করিয়া লওয়া উচিত, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জল সেচন দ্বারা মাটি যেন

কাদাটে হইয়া না যায়। মাটি ঈষৎ রস হইবে অথচ বেশ দানা বাঁধিয়া রুরা থাকিবে। এক্ষণে রোপনীয় চারার তাবৎ কৃষ্ণ ও শুক ডালগুলিকে গোড়া ঘেসিয়া কর্তন করিয়া গর্ত মধ্যে অল্প মাটি দিয়া, সেই মাটিকে হস্ত দ্বারা বেশ করিয়া চাপিয়া দিতে হইবে। চারা গাছের ডালগুলি সংখ্যায় অধিক, কিম্বা অধিক দীর্ঘ হইলে তাহা কাটিয়া কম ও ছোট করিয়া দেওয়া উচিত। চালানী গাছের গোড়ায় প্রায় এটেল' মাটি থাকে। এই মাটি সমেত গাছ রোপন করিলে, শিকড় সমূহ সে মাটি ভেদ করিতে সহজে সক্ষম হয় না, সুতরাং সেই মাটির চাপ অল্পাধিক ভাঙ্গিয়া দিয়া গাছ রোপন করা কর্তব্য। এক্ষণে গাছটিকে গর্তে বসাইয়া চারিদিক হইতে মাটি দিয়া গর্ত পূর্ণ করতঃ খুরপী বা নিড়েনের বাঁট দ্বারা মাটিকে বেশ করিয়া চাপিয়া দিতে হইবে, বলা বাহুল্য যে, মাটি যেন কঠিন হইয়া না যায়, কারণ তাহা হইলে মাটির রস শোষণ করিবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটবে।—চারার, একটা মূল কাণ্ডযুক্ত হইলে তাহাকে ঈষৎ হেলাইয়া রোপন করা ভাল। হেলাইয়া পুতিলে শীঘ্রই তাহার গাত্র হইতে নুতন শাখা উদ্গত হয়। চারা গাছকে ভবিষ্যতে দাঁড়া-গাছে (Standard) পরিণত করিবার উদ্দেশ্য থাকিলে সরল ভাবে রোপন করা উচিত কিম্বা রোপিত হইবার পরে উহা হইতে যে ডালটি সরল ও উর্দ্ধাভিমুখী হইয়া উদ্গত হইবে, সেইটিকে বজায় রাখিয়া অপরগুলিকে কাটিয়া ফেলিতে হইবে।

গাছ রোপন করা হইলে, উহার শিরোভাগ হইতে জল ঢালিয়া তাবৎ গাছটী ভিজাইয়া দিতে হইবে, গাছের উপরিভাগে জল সেচন করিলে সেই জল পরে গোড়ার মাটিকেও সিক্ত

করিয়া দেয়। রোপিত চারা জোড়-কলম হইলে, রোপণের ৫।৭ দিবস পরে জোড়ের উপরিভাগস্থিত জয়বণ্টীর অংশকে তীক্ষ্ণ ছুরী দ্বারা সাবধানে কাটিয়া দিতে হয়। কলম অধিক দিনের হইলে হাপোরে থাকিবার কালেই জয়বণ্টীকে কাটিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। জোড়ের নিম্নাংশে জয়বণ্টীতে ফেঁকড়ি উদ্গত হইয়া থাকিলে রোপণ কালে ভাঙ্গিয়া দেওয়া আবশ্যিক। জয়বণ্টীকে বর্জিত হইতে দিলে কলম নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

## চতুর্থ অধ্যায়

—:—

গোলাপ বৃক্ষ ছোট বড় অনেকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত।  
এস্থলে কেবল বিশেষ বিশেষ কয়েকটি শ্রেণীর  
শ্রেণী বিভাগ বিষয় আলোচিত হইবে। সেই সকল শ্রেণীর  
মধ্যে চির-শঙ্কর বা হাইব্রিড-পার্পেচুয়াল (Hybrid Perpetual,  
বোরবোঁ (Bourbon), মস্ (Moss), মস্ক (Musk), ডামাস্ক  
(Damask), নয়সেট (Noisette) টী (Tea-scented), ফেয়ারি  
(Fairy rose), রোজা ইণ্ডিকা (Rosa Indica) প্রধান।  
প্রত্যেক শ্রেণী,—অল্পাধিক প্রকারের সমষ্টি। গোলাপ জাতির  
মধ্যে এত প্রকারের গাছ আছে যে সহজে অনেক গাছকে  
চিনিয়া উঠিতে পারা যায় না, এজন্য সকল গাছকে বিশেষরূপে  
চিনিয়া রাখিবার চেষ্টা করা উচিত। প্রত্যেক গাছটীকে চিনিতে  
না পারিলেও, উহারা যে কোন কোন শ্রেণীর অন্তর্গত তাহা চিনিয়া

রাখিতে কৃষ্ট হয় না। গাছের নাম জ্ঞাত না থাকিলে প্রকৃতি দেখিয়া কোন গাছ কোন শ্রেণীর অন্তর্গত তাহা বুঝিতে পারিলে অনেক সময় উপকার দর্শিরা থাকে। এজন্য অনেক গোলাপ-পালক গাছে নাম বা নম্বর লিখিয়া রাখেন। নাম বা নম্বর অধিক দিন স্থায়ী হয় না, কারণ শিশির, বৃষ্টি, ধূলাও কাদাম লেখা মুছিয়া যায়, টিকিট খসিয়া যায়। গাছ রোপণের পর কাগজে নক্সা করিয়া তাহাতে নাম বা নম্বর লিখিয়া রাখিলে সর্বাপেক্ষা উত্তম ও স্থায়ী কাজ হয়। এইরূপ বন্দোবস্ত করিবার সঙ্গে প্রত্যেকটিকে চিনিয়া রাখিবার চেষ্টা করা আবশ্যিক ও ভাল। গাছ চিনিয়া রাখা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার অধীন। যাহা হউক, এক্ষণে গোলাপের শ্রেণীগত বিশেষত্বের বিষয় আলোচনা করা যাউক।

১ নং চিত্র



হাইব্রিড-পার্পেচুয়াল-শ্রেণী অতি বৃহৎ এবং বোধ হয়  
 গোলাপের সকল শ্রেণী হইতেও বৃহৎ। এই  
 হাইব্রিড শ্রেণীর তাবৎ গাছই উর্দ্ধমুখী সরল শাখা-সম্পন্ন  
 পার্পেচুয়াল হইয়া থাকে। ইহাদিগের শাখা, পত্র ও পুষ্প-  
 বৃত্ত সমূহ অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়। ইহাদিগের তাবৎ শাখা  
 মূলদেশ হইতে উল্লম্ব হইয়া ছড়ির ভায় সরল হয়, এই জন্ত  
 ইহাদিগের শাখাপল্লবকে ছড়ি বলাই সম্ভব। এই জাতের গাছ

শীতোত্তাপসহ, এজন্ত ইহার Hardy বলিয়া পরিচিত। গাছের আকার ও বৃদ্ধিশীলতা অনুসারে হাইব্রিড-পার্পেচুয়াল জাতির গাছ তিন ভাগে বিভক্ত। যে সকল গাছের ছড়ি ৬৭ ফুট দীর্ঘ ও তেজাল হয়, তাহাদিগকে অতি-বাড়ন্ত বা Vigourous ; যাহাদিগের ছড়ি ৪৫ ফুট দীর্ঘ ও গাছের প্রকৃতি মাঝ-বাড়ন্ত তাহাদিগকে তেজাল বা Robust, এবং যাহাদিগের পল্লব ৩৪ ফুট দীর্ঘ হয় ও গাছ ধীরবর্দ্ধক, তাহাদিগকে ধীর-বর্দ্ধক বা Moderate grower বলা যায়। হাইব্রিড-পার্পেচুয়াল জাতি সাধারণতঃ শীতকালে পুষ্প প্রদান করিয়া থাকে কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি বর্ষাকালে দ্বিতীয়বার পুষ্প প্রদান করিয়া থাকে। শরতের শেষ ও হেমন্তের প্রারম্ভে ইহাদিগকে ছাঁটিয়া দিতে হয়। ইহাদিগের পুষ্প সুগন্ধদায়ক, এবং বর্ণ প্রায় অধিকাংশেরই লাল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

বোরবো জাতীয় গাছ অনেকটা হাইব্রিড-পার্পেচুয়াল ধরণের  
বোরবো কিন্তু তদপেক্ষা ঝড়াল হইয়া থাকে। এই  
শ্রেণীগত যেগুলি বৃদ্ধিশীল তাহাদিগকে দেয়ালের  
গায়ে বা খুঁটিতে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিলে চলে। ছোট জাতির  
গাছগুলিকে গামলায় রাখিবার উপযোগী।

‘মস’ জাতির পুষ্প-বস্তু শৈবাল সদৃশ পদার্থ সমন্বিত, এজন্ত  
তাহাদিগকে ‘মস’ গোলাপ নামে অভিহিত করা  
হইয়া থাকে। ‘প্রভিন্স’ জাতীয় গোলাপ  
হইতে মস জাতির উৎপত্তি বলিয়া অনেকে মনে করেন। এত-  
দ্রুত শ্রেণীর একই গাছ হইতে বিভিন্ন বর্ণের পুষ্প উৎপন্ন হইতে  
প্রায় দেখা যায়। যে শাখায় ভিন্ন বর্ণের পুষ্প উৎপন্ন হয়,



সেই শাখাকে জোড়-কলম দ্বারা স্বতন্ত্র করিয়া লইলে একটা নূতন জাতির গোলাপ লাভ হয়। এইরূপে প্রভিন্স হইতে মস জাত প্রথম উৎপন্ন হয়। মস জাতির মধ্যে যত প্রকারের গাছ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই উল্লিখিত উপায়ে। মস জাতীয় গাছের দাবা-কলম ও শাখা-কলম রোপণ করিবার জন্য বিশেষ সারবান-ভূমির আবশ্যিক, অমৃন্দের ভূমিতে ইহাদিগের প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া যাহাবার বিশেষ সম্ভাবনা। চোক-কলম, জোড়-কলম প্রভৃতির জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে হয় না।

মস-শ্রেণীর পুষ্প হইতে গোলাপ-জল ও আতর প্রস্তুত

হইয়া থাকে। এ শ্রেণীর গাছ অতি তেজাল ও

মস

কণ্টকাকীর্ণ হয়। গাছের আকৃতি তাদৃশ সুস্মী

নহে, এবং পুষ্পের আকার ও গঠন পরিপাটিজনক নহে। ইহারা কাস্তুন মাসের শেষ ভাগ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত পুষ্প প্রদান করে, অপর ঋতুতে ইহারা পুষ্প প্রদান করিতে পারে না। কখন কখন বর্ষাকালে ছই একটা কুল ফুটিতে দেখা যায়, কিন্তু তাহা ধর্ম্ম্য মধ্যেই নহে। বাঙ্গালা ভাষায় ইহারা ‘বসরাই’ (Bussorah) গোলাপ নামে অভিহিত। পুষ্প গন্ধযুক্ত—ইহা বলাই বাহুল্য।

আর এক জাতীয় গোলাপ হইতে আতর ও গোলাপ জল

তৈয়ার হইয়া থাকে,—তাহারা ডামাস্ক জাতির

ডামাস্ক

গোলাপ। বাঙ্গলায় তাহাদিগকে ‘চৈতা’ (চৈত)

গোলাপ কহে। এই শ্রেণীর গাছ মসৃণে বর্ধিত হয় না এবং গাছের আকার তাদৃশ পরিপাটি জনক নহে। ইহাদিগের ফুলে

সৌরভ আছে। মস্ক ও দামাস্ক এই দুই শ্রেণীর ফুল হইতে আতর ও গোলাপ-জল প্রস্তুত হইয়া থাকে, আর অল্প কোন গোলাপ হইতে হয় না, ইহার গুণতত্ত্ব কি বলিতে পারি না। হাইব্রিড পার্পেচুয়াল জাতীয় মণ্টী-ক্রিষ্টো ফুলের কি মনোহর সৌরভ! নয়সেট জাতীয় মার্শাল-নীলের কি প্রাণতোষিণী স্নগন্ধ! এরূপ বহু গোলাপেরই মনোহর সৌরভ আছে কিন্তু উক্ত উদ্দেশ্যে তাহাদিগের কোন ব্যবহার নাই দেখিয়া আমার মনে হয় যে, ডামাস্ক ও মস্ক,—এই দুই জাতীয় পুষ্পে সমধিক পরিমাণে তৈল বর্তমান থাকায় আতর গোলাপ তৈয়ারির জন্য ব্যবহৃত হয়।

এক শ্রেণীর গোলাপের পুষ্পে ঐষৎ ও মুছ চা-গন্ধ পাওয়া যায় বলিয়া তাহাদিগকে Tea scented গোলাপ  
 টি কহে। হাইব্রিড-পার্পেচুয়ালের স্থায় 'টী' একটি বিস্তৃত জাতি। 'টী'-জাতীয় গাছ বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট হয়। ইহাদিগের শাখা-প্রশাখা এবং পত্র-পুষ্প কোমল। তাহা বাতীত পত্র সমূহ পিচ্ছিল ও চিকণ। পুষ্পবস্ত্র সমূহ দীর্ঘ ও কোমল বলিয়া পুষ্প সমুদায় ঐষৎ হেলিয়া পড়ে, এবং দেখিলেই ইহাদিগকে রমণী-পকৃতি ও লজ্জাশীলা বলিয়া স্বতঃই মনে হয়। টী-জাতীয় গাছ ঝড়াল হয়। জাতি বিশেষে দুই হাত হইতে চারি পাচ হাত উচ্চ ও পার্শ্বদেশে তদনুরূপ বিস্তৃত হয়। ইহাদিগের কটক সমূহ অল্পাধিক ভূম্যাভিমুখী ও ঐষৎ লাল বর্ণের হইয়া থাকে। ঐষৎ রমাল মাটিতে ও পড়ন্ত-রৌদ্রহীন স্থানে ইহারা ভাল থাকে। ইহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধভাবে অথবা পুঞ্জ-কারে রোপণ না করিয়া তৃণমণ্ডলের স্থানে স্থানে কেয়ারি মধ্যে

এক একটা 'গাছকে স্বতন্ত্র ভাবে রোপণ করিলে তৃণমণ্ডল ও গাছ—উভয়েরই শোভা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। জাতি বিশেষের বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি অনুসারে প্রত্যেক গাছের জন্য চারি ফুট হইতে ছয় ফুট স্থান দিতে হয়। ইহাদিগের পুষ্পের সৌরভ অতি মধুর কিন্তু অনেকের নিকট তাহা প্রীতীকর নহে। ইহারা প্রায় বারমাস অল্পাধিক পুষ্প প্রদান করিয়া থাকে। ইহারা অধিক ছাঁট সহ্য করিতে পারে না এজন্য ইহাদিগের পুরাতন শাখা-প্রশাখার ডগা মাত্র ছাঁটিতে হয়।

টী-জাতীয় গোলাপের সহিত ইহাদিগের অনেক সাদৃশ্য আছে

কিন্তু প্রথমোক্ত জাতির গোলাপ অপেক্ষা ইহারা  
নয়সেট অধিক দীর্ঘশাখী হয়। ইহারা লতিকা স্বভাব

স্বভাবঃ ইহাদিগকে জাফরি বা খুঁটিতে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়া আইশ্বক নচেৎ ইহারা বিশৃঙ্খল ভাবে চারিদিকে প্রসারিত হইয়া পড়ে। 'টী'র ইহারা অধিক ছাঁট সহ্য করিতে পারে না। অধিক করিয়া ছাঁটিলে গাছের আকার ক্রীতশীল হইয়া পড়ে। ইহারা শীতের শেষ ভাগ হইতে পুষ্প প্রদান করিতে থাকে এবং বৎসরের অধিকাংশ সময়ই পুষ্প প্রদান করে। নয়সেট গাছের বিশেষত্ব এই যে, স্তবকে স্তবকে পুষ্প ধারণ করে। নয়সেট গাছ কোমল প্রকৃতি, অনেক পরিমাণে টী জাতীয় গাছের তায়। ইহাদিগের গন্ধ মধুর। টী জাতীয় গাছের তায় ইহাদিগের কণ্টক সমূহ ঈষৎ বক্র, ভূম্যভিমুখী ও লালভ। পড়ন্ত রৌদ্র হীন স্থানে রোপণ যোগ্য গাছ। ইহাদিগের পুরাতন ডগার শিরোভাগ মাত্র ছাঁটিতে হয়।

বোরসন্ট জাতীয় গোলাপ গাছে কণ্টক থাকে না। ইহা-  
 দিগের দণ্ড বা ছড়ি সমূহ সুদীর্ঘ হইয়া থাকে  
 বোরসন্ট এবং 'দণ্ডস্থ' গ্রন্থি সমূহ দূরে দূরে অবস্থিত।  
 শীতের শেষ ভাগে ও বর্ষাকালে ইহাদিগের পুষ্প প্রদান করিবার  
 সময়। ছড়ির শিরোভাগে স্তবকে স্তবকে পুষ্প ধারণ করে,  
 কিন্তু নরসেটের ত্রায় তত অধিক ফুল হয় না। ইহাদিগের  
 পুরাতন ছড়িদিগকে মূল বেঁসিয়া কাঁটিয়া দিতে হয় এবং শিরো-  
 ভাগের কিয়দংশ কাটিয়া দিলে 'শাখা' নির্গত হইয়া পুষ্প ধারণ  
 করে। বোরসন্ট জাতীয় গাছ শুদ্ধাকারে বা ছত্রাকারে নিয়ন্ত্রিত  
 হইবার উপযোগী।

পরী-গোলাপের ইংরাজি নাম (Fairy Rose) ফেরারি  
 রোজ। ইহারা স্বভাবতঃ অতি ক্ষুদ্র, এমন কি,—  
 ফেরারি এফ ফুটের অধিক উচ্চ হয় না। যেরূপ গাছ,  
 ফুলও তদনুরূপ ক্ষুদ্র, কিন্তু বহু পুষ্প। পরী-গোলাপকে পুঞ্জ  
 পুঞ্জে রোপণ করিলে ফুলের সময় দিক আলোকিত হয়। তৃণ-  
 মণ্ডল মধ্যে স্থানে স্থানে ফেরারি রচনা করতঃ তন্মধ্যে ঘন ভাবে  
 পরী-গোলাপ রোপণ করিলে কিম্বা পথি পার্শ্বস্থ ইঁসিয়াতে ২৩  
 সারি রোপণ করিলে বড় বাহার হয়। ইহাদিগের পল্লব অতিশয়  
 সরু হয়। ইহাদিগকে ছাঁটিবার তত আবশ্যক হয় না। গাছ  
 অধিক ঘন ও আকারলব্ধ হইয়া পড়িলে অল্পাধিক ছাঁটিয়া দিলেই  
 চলিতে পারে।

জয়ঘণ্টা নামে যে গোলাপ সাধারণো পরিচিত তাহার প্রকৃত  
 জাইগ্যান্টিয়া নাম 'রোজা-জাইগ্যান্টিয়া'। ইহা রোজা-  
 ইণ্ডিকা (Rosa Indica) শ্রেণীভুক্ত। জয়ঘণ্টা

গাছ অতিশয় বিস্তৃত হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে ইহা লতানিয়া গোলাপ। সূচাক্রমে নিয়ন্ত্রিত করিলে ইহার প্রত্যেক শাখাকে বহুদূর পর্য্যন্ত লইয়া বাইতে পারা যায়। পুষ্প উৎপন্ন করিবার জন্ত ইহাকে ছাঁটিবার আবশ্যক হয় না। অপরাপর গোলাপের ন্যায় পুষ্পিত হইবার পূর্বে জয়ঘণ্টীকে ছাঁটিয়া দিলে উহা বাড়াইয়া যায় অর্থাৎ অমিত তেজে তাহাতে নূতন ফেঁকড়ি উদ্গত হয় এবং ফুল হয় না। ফেরারি গোলাপের ন্যায় ইহার ফুল ছোট ছোট হয় কিন্তু অপৰ্য্যাপ্ত হইয়া থাকে। ফাস্তুন মাসের শেষ ভাগ হইতে বৈশাখ মাসের শেষ পর্য্যন্ত ফুলের সময়। এই সময় গাছে রাশি রাশি স্তবক বাহির হয় এবং প্রত্যেক স্তবকে ৫০/৬০ বা ততোধিক পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। পুষ্পের বর্ণ,—ফিকে গোলাপী ও দোরভ মধুর। রাশি রাশি স্তবকে রাশি রাশি পুষ্প বিকশিত হইলে যে কি শোভা হয়, তাহা বর্ণনাতীত। গ্রন্থকারের বাংলার একটা জয়ঘণ্টী গাছ আছে, তাহার বয়ঃক্রম ২৬ বৎসর হইবে। উহা প্রায় পঞ্চাশ হাত দীর্ঘ। দ্বারবঙ্গ মহারাজের রাজনগরস্থ প্রাসাদে একটা সুদীর্ঘ ও প্রায় বিংশতি হস্ত উচ্চ প্রাচীরকে আবৃত করিবার জন্ত তাহার পাদদেশে কয়েকটা জয়ঘণ্টী গোলাপের গাছ আছে। ইহাদিগের বয়ঃক্রম তিন বৎসরের অধিক নহে। ইতোমধ্যে গাছগুলি এত তেজাল হইয়া বর্জিত হইয়াছে যে, সমগ্র দেয়ালটা একবারেই ঢাকিয়া গিয়াছে। এই সকল গাছে যখন ফুল হয়, তখন বড় বাহার হয়। জয়ঘণ্টী গোলাপের কিন্তু আদর নাই, লোকে ইহাকে তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে, অধিক কি কোন উদ্দানেই ইহা স্থান পায় না। কোন স্থানকে আবৃত করিতে হইলে ইহা দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া

যায়। জোড়-কলম করিবার জন্য জয়ঘণ্টীর, শাখা-কলম আবশ্যক হইয়া থাকে। সচরাচর ইহার শাখা-কলমেই জোড়-কলম বাঁধা হইয়া থাকে। জাইগ্যান্টিয়া অতিশয় শীত-তাগ্ন সহ এবং সকল স্থানেই সহজে স্নানাবিক্ত হইয়া লয়। এই জন্য কলম বাঁধিবার পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। জয়ঘণ্টী গাছ অতিশয় কণ্টকাকীর্ণ, এজন্য উত্তানের চারিপাশে রোপণ করিলে উত্তান মধ্যে গবাদি পশু গা চোর প্রবেশ করিতে পারে না। প্রাচীর-নিয়ন্ত্রিত জয়ঘণ্টীর শাখা-প্রশাখায় নানা জাতীয় গোলাপের চোক বসাইয়া দিলে, সেই সকল চোক হইতে শাখা উৎপন্ন হইয়া যখন নানা বর্ণের ফুল ধারণ করে, তখন দেখিতে মনোহর ও কৌতুককর হয়, তাহা ব্যতীত এক গাছ হইতে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ফুল পাওয়া যায়।

যে গোলাপকে আমরা সঁউতি নামে অভিহিত করিয়া থাকি তাহাকে রোজা ম্যাক্রোফিলা (Rosa macrouhylla) কহে। ইহা একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী। ইহা দুই তিন ফুট মাত্র উচ্চ হয় কিন্তু চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া থাকে। শীতের কয়মাস ব্যতীত প্রায় বারমাস প্রচুর ফুল হয়। ফুলের বর্ণ কঁটা মাংসবৎ; গঠন,—খুব খন। মাচামট্ট নিয়ন্ত্রিত করিবার উপযোগী। তৃণমণ্ডলের স্থানে স্থানে এক একটা গাছ রোপণ করিলে ফুলের সময় বড় বাহার হয়।

চীন দেশ হইতে আনীত হওয়ার 'চায়না'র সাধারণ নাম,—  
চীনে-গোলাপ-বা চায়না-রোজ (china rose)।  
চায়না বা  
চীনে-গোলাপ  
ইহার স্বভাবতঃ বহু-শাখী এবং রাশি রাশি পুষ্প  
প্রদান করে। ইহার অধিক যত্নের প্রয়োজন নহে।

গাছে বারোমাসই পাতা থাকে ; পাতার বর্ণ,—ঘন ; আকার,—  
 পূর্ণ, এবং গাছের প্রকৃতি ঝাড়াল, এই জন্ত চীনে-গোলাপ উদ্ভানে  
 স্থান পাইবার যোগ্য। নিতা দেব-সেবার জন্ত, কিম্বা ফুলদানি  
 সাজাইবার জন্ত প্রতিদিনেই ফুলের আবশ্যক হয়, এরূপ স্থলে  
 বাগানে অত্রাধিক চীনে-গোলাপের গাছ থাকা আবশ্যক। এই  
 শ্রেণীর অন্তর্গত ক্ষুদ্র জাতীয় গাছ মাঝেই উদ্ভানের হাঁসিয়াতে  
 সমশ্রেণীতে ঘনরূপে রোপিত হইবার বিশেষ উপযোগী। চীনে-  
 গোলাপের মূল গাছ হইতে বহু জাতীয় চীনে গোলাপ উৎপন্ন  
 হইয়াছে এবং সেই সকল গাছের আকৃতি ও প্রকৃতি, অধিকন্তু  
 ফুলের বর্ণ ও গঠন মধ্যে এতই সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় যে,  
 ইহাদিগের সকল গুলিকে চিনিয়া রাখা দুষ্কর। অতি সহজে শাখা  
 কলমে ইহাদিগের চারা উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং অল্পদিন  
 মধ্যে বহু সংখ্যক চারা উৎপন্ন করিতে পারা যায়। আর্কডিউক  
 চার্লস্, ম্যাডাম্ ব্রিয়ন প্রভৃতি গোলাপ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।  
 কোভুককর সবুজ-গোলাপ (Viridiflora) চায়না জাতির মধ্যে  
 গণ্য।

## পঞ্চম অধ্যায়

ফুলনের পরিমাণ বৃদ্ধি, ফল ফুলের আকার, গড়ন, সৌন্দর্য্য  
 প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধন এবং বৃক্ষের আকার  
 হাঁটিবার ও স্বাস্থ্য সংস্থার করিবার জন্ত উদ্ভিদকে সময়  
 উদ্দেশ্য সময় ছাঁটিয়া দিতে হয়। ছাঁটিয়া দিলে উদ্ভিদের

রস আপাততঃ ব্যয়িত হইতে পায় না। উদ্ভিদগণ মৃত্তিকা হইতে মূল দ্বারা যে রস আহরণ করে, তাহা কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখায় ভিত্তর দিয়া পত্র সমূহে গিয়া পৌছে। অতঃপর পত্রকুণ্ড (Stomata) দিয়া সেই রস বাষ্পাকারে বহির্গত হইয়া যায়। যতই রস আহরিত হউক, উদ্ভিদ মধ্যে তাহা আবদ্ধ থাকিতে পারে না। যত রস আহরিত হয়, ততই তাহা বাষ্পাকারে বহির্গত হইয়া যায় কিম্বা যত রস বহির্গত হইয়া যায়, ততই রস মৃত্তিকা হইতে উদ্ভিদ আহরণ করিয়া থাকে। আহরণ ও বর্জন পরস্পরের উপর নির্ভরপর। বর্জন না হইলে আহরণ হয় না, এবং আহরণ না হইলে উদ্ভিদ বর্জিত হইতে পারে না। বর্জিত হইবার উপকরণ—জল নহে, জলের অন্তর্গত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সার পদার্থ। জল আহরিত হইয়া বর্জিত হয় কিন্তু স্থূল পদার্থ নিচয় উদ্ভিদ মধ্যে থাকিয়া যায় এবং তাহার অঙ্গ সোষ্টবের পূর্ণতা ও পরিবৃদ্ধি সাধন করে। উদ্ভিদের অংশ বিশেষকে ছাঁটিয়া দিলে পত্রের সংখ্যা হ্রাস হয়, ফলতঃ উদ্ভিদের বর্জনতা কমিয়া যায় ও বর্জনীয় রস দিগান্তরে প্রবাহিত হইয়া উদ্ভিদের অবস্থিত অংশকে সমধিক পরিপুষ্ট করে। অবশেষে অপরূপ চোক সমূহ পরিপুষ্ট হইয়া শাখার আকারে পরিফুট হয় এবং গাছ গজাইয়া উঠে। এই সময়ে গাছের বৃদ্ধি অস্বাভাবিক দ্রুত হইয়া থাকে, কারণ কর্তিত হইবার পর উদ্ভিদের বর্দ্ধমানতা কিছু দিনের জন্ত স্থগিত থাকে, পরে উহা সমূহ শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং বৃদ্ধ শক্তি মুক্তিলাভ করিয়া প্রবলভাবে ধারণ করে। এই জন্ত কর্তিত গাছ পরে এত শীঘ্র গজাইয়া উঠে এবং নবমুকুলিত শাখা-পল্লব সুপুষ্ট, তেজাল ও রসাল হইয়া থাকে। এই সময়ে শক্তির



আধিক্য হেতু কঠিনত উদ্ভিদ বর্ধিত হইবার সম্যক অবসর না পাইয়া পুষ্পোন্মুখী হইয়া পড়ে। পুষ্পিত হইবার কালই উদ্ভিদের পূর্ণাবস্থা জানিতে হইবে। শাখা প্রশাখার সংখ্যা অধিক হইলে বৃদ্ধিশক্তি বিকশিত হইবার পথ অধিক হয়, সুতরাং গাছে বহু সংখ্যক শাখা উদ্ভূত হয়, পল্লবগণও দীর্ঘ হয়।

গোলাপ গাছের ত্রী, সৌন্দর্য, স্বাদ্য প্রভৃতি ছাঁটিবার প্রণালীর উপর নির্ভর করে। লক্ষ্যহীন হইয়া ছাঁটের সহিত অবিমুখ্যতা সহকারে ছাঁটিলে গাছ কদম্বী হইয়া গাছের সম্বন্ধ যায়, গাছে বহু ফেঁকড়ি উৎপন্ন হয়, ফুলের গড়ন অসম্পূর্ণ ও ফলন অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে। সুচারুরূপে ছাঁটাই কার্য সম্পাদন করিতে পারিলে এ সকল দোষ সংঘটিত হইতে পারে না, উপরন্তু ফুল সমৃদ্ধ সুষ্টাম ও সমুজ্জ্বল হইয়া থাকে। অযত্নরক্ষিত গোলাপ-গাছ আগাছার আকার ধারণ করিয়া থাকে। সচরাচর দেখা যায়, পুষ্প-কালেই লোকে গোলাপের পরিচর্যা করিয়া থাকে এবং পুষ্প কাল অতিবাহিত হইলে আর তাহাদিগের প্রতি বড় কেহ দৃষ্টি রাখে না, তাহার ফলে গাছ যথেষ্টরূপে বর্ধিত হইতে থাকে এবং গাছের অযথা স্থান সমুহ হইতে বহু ফেঁকড়ি উৎপন্ন হয়। এই সকল অপ্রয়োজনীয় শাখা ও ফেঁকড়ি দিগকে ছাঁটিবার সময় অগ্রে কাটিয়া ফেলিতে হয়। সুরক্ষিত গাছে ইহারা উদ্ভূত হইতে পারে না, এবং উদ্ভূত হইবার উপক্রম দেখিলেই তাহাদিগকে কাটিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। উদ্ভূত হইবামাত্র কঠন না করিলে উহার সঙ্ঘৎসর ধরিয়া বৃক্ষের শক্তি নষ্ট করে ও আহাৰ্য্য অপহরণ করে। সেই সকল অপ্রয়োজনীয় পল্লব বিকশিত হইতে না পারিলে

আসল রক্ষাংশ সমৃদ্ধিক তেজাল হয় ও মূল শাখা-প্রশাখাগণ অপেক্ষাকৃত অধিক সুপুষ্ট হইতে পায়। অপ্রয়োজনীয় পল্লব-গণের পীড়নে মূল বৃক্ষ শীর্ণ ও হতশ্রী হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে গোলাপ বৃক্ষের প্রতি বারমাস দৃষ্টি রাখিতে হয়। কেবল যে ফুলের জন্যই গাছের আদর ও পরিচর্যা করিতে হয় তাহা নহে। উদ্ভিদ যাত্রাই উদ্ভানের অলঙ্কার স্বরূপ সুতরাং সকল গাছকেই বারমাস সমভাবে লালন পালন করা উচিত। যে সকল গাছ বারমাস তেজাল থাকে, পুষ্পকালে সাময়িক পরিচর্যা পাইলে তাহার বহু পরিমাণে, ও অতি সুন্দর সুঠাম ফুল প্রদান

২ নং চিত্র



করিয়া থাকে। অতঃপর গাছ বাহাতে সুনিয়মে কর্তৃত্ব হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন। যথেষ্টভাবে গাছ ছাঁটিলে যে সব দোষ ঘটে তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। গোলাপ গাছ ছাঁটিবার কতকগুলি নিয়ম আছে। উদ্দেশ্যের সহিত নিয়মের সামঞ্জস্যতা রক্ষা করিয়া ছাঁটাই-কার্য্য নির্বাহ করা বিচক্ষণ ব্যক্তির কার্য্য।

বহু লোকের গোলাপের সখ আছে, তাহাদিগের উদ্ভানে বহুবিধ ও বহু সংখ্যক গোলাপ গাছ আছে। ছাঁটাই কার্য্যে তন্মধ্যে অনেক মূল্যবান গোলাপও থাকে, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, তাহাদিগের লালন পালন ভার অকৃতি ব্যক্তিদিগের হস্তে জ্ঞাত থাকে। গোলাপের সখ রাখিতে হইলে তাহাদিগের লালন-পালন সৰ্ব্বদা কিঞ্চিৎ অজ্ঞান থাকে। উচিত নতুবা সখ রাখিয়া সুখ হয় না। বরং গাছ না ছাঁটা ভাল, কিন্তু অর্থাচানের হস্তে অজ্ঞ চালনার

ছাঁটাই কার্য্যে  
যেচ্ছাচারিতা

ভার্যাপিত হইলে গাছের প্রাণ বিয়োগেরও সম্ভাবনা আছে। উদ্ভানস্বামীকেই যে স্বহস্তে গাছ ছাঁটিতে হইবে এরূপ আশা করা যায় না, কিন্তু তৎসম্বন্ধে উদ্ভানস্বামীর অস্বাভাবিক জ্ঞান থাকিলে অনেক উপকার দর্শিয়া থাকে। গোলাপদলী বিজ্ঞ উদ্ভানপালই গোলাপ ছাঁটিতে সক্ষম, কিন্তু সেরূপ উদ্ভানপালও দেশে বড় বিরল। সচরাচর যাহারা মালী নামে খ্যাত, তাহারা গোলাপ গাছ ছাঁটিয়া থাকে কিম্বা গোলাপের ধ্বংশের পথ সরল করিয়া দেয়, কারণ এতছত্তই এক কথা। ইহাদিগের কৃতিত্বের বিষয় স্বরণ হইলে আমার সেই শ্রীমন্ত পরামণিকের কথা স্মৃতি মনে উদয় হয়। এস্থলে শ্রীমন্ত সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। শ্রীমন্ত নামে এক পরামণিক ছিল। প্রায় ৪০।৪২ বৎসর গত হইল কোন বালকের পেটে একটি বিব-স্ফোটক হয়। তখনকার দিনে এত ডাক্তার কবিরাজের প্রাচুর্য্য ছিল না এবং সামান্য অসুখে লোকে তাঁহাদিগকে আহ্বান না করিয়া, গৃহস্থালী ও টোটকা মতে প্রায় চিকিৎসা করাইত। উক্ত বালকের স্ফোটককে অস্ত্র করিবার জন্য শ্রীমন্ত আহত হয়। শ্রীমন্ত অতি গভীরভাবে চক্ষু চশ্মা স্থাপন করতঃ নরুণটিকে বারবার ঘর্ষণ দ্বারা শানিত করিয়া রোগীর পেটের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল। সেই নিদাক্ষণ অস্ত্রাঘাতে রোগীর প্রাণ যায়-যায়! শ্রীমন্ত উৎসাহ সহকারে তাহাকে অনেক শ্লোক বাঁক্য দ্বারা সান্তনা করিবার চেষ্টা করিল। সেই অস্ত্রাঘাতে রোগীর স্ফোটক আরোগ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু শ্রীমন্তর পক্ষে উহা যে অসমমাহসিকতার কার্য্য হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইদানাং ডাক্তার কবিরাজের প্রাচুর্য্য

হওয়ার শ্রীমন্ত দুঃখিত হইয়াছিল, কারণ তাহার অল্প চিকিৎসার কার্য্যটি ডাক্তারদিগের হাতেই এক্ষণে গিয়া পড়িয়াছিল। এইরূপ অল্পচিকিৎসা, জলপড়া প্রভৃতি দ্বারা শ্রীমন্ত তাহার রোগী, —আসামী বলিলেই ভাল হয়,—বা তাহার আত্মীয়দিগের নিকট হইতে কিছু উপার্জন করিত। অনেক দিন হইল শ্রীমন্ত বেচার। পরলোকগত হইয়াছে। যাহা হউক, এইরূপে পৌষায়ের স্ত্রীর কলাকল বিবেচনায় হইয়া গাছ ছাঁটিবার প্রথাকে আমি ‘শ্রীমন্ত-প্রণালী’ (Srimanta System) নামে অভিহিত করিয়া থাকি। এক্ষণে এদেশে উদ্ভানতার দিন দিন উন্নতি হইতেছে, উদ্ভানতার অল্প ক্রমশঃ পুষ্টি লাভ করিতেছে, সুতরাং এক্ষণে আর শ্রীমন্তদিগের উপর একবারে নির্ভর করা চলে না। স্বয়ং পরিচর্যা করিতে না পারিলেও শ্রীমন্তদিগকে উপদেশ দিলে কিম্বা তাহাদিগের কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিলে ও ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলে তাহাদিগের শিক্ষা হয়, উদ্ভিদগণের প্রাণনাশ ভীতী দূর হয়, মালিকেরও অর্থ, ব্যয় ও শ্রম সার্থক হয়। সচরাচর যে প্রণালীতে গোলাপ গাছ ছাঁটা হইয়া থাকে, তাহা কোন নিয়মাবলী নহে। কর্তৃক আপন ইচ্ছামত সকল গাছকে সমভাবে ও একই প্রণালীতে কর্তন করিয়া কার্য্য সমাধা করে। গোলাপের জাতি, গাছের অবস্থা ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের প্রতি কোন লক্ষ্য না রাখিয়া গাছ ছাঁটা হইয়া থাকে। পুরাতন ও অকর্ম্মণ্য শাখাদিগকে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত তাহাও ইহাদিগের মনে হয় না। এই সকল কারণে গাছের গোড়া ছড়ি পরিবেষ্টিত হইয়া থাকে। এই সকল ছড়ির অর্দ্ধাংশের ও অধিক অকর্ম্মণ্য ও মরণোন্মুখ অবস্থাপন্ন। এই সকল

পুরাতন ছড়ির কর্তিতাংশকে সমূলে কাটিয়া ফেলিলে গাছের মূলদেশ হালকা হয়, কর্ণঠ দণ্ড সকল তেজাল তর, নূতন ছড়ি উদ্গত হইয়া গাছ শ্রীমান হয় এবং সুঠাম সুন্দর ফুল দ্বারা সুশোভিত হয়। স্বেচ্ছাচারিতা সহকারে পুনঃ পুনঃ কর্তন করিলে দুই তিন বৎসর মধ্যেই গাছ নিস্তেজ হইয়া পড়ে,— অবশেষে মরিয়া যায়।

গোলাপের জাতি, বাতাবিক বৃদ্ধি, বর্তমান অবস্থা ও কর্তনের

ছাঁটিবার  
সাধারণ নিয়ম

উদ্দেশ্য—এই কর্তা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং সকল দিক বজায় রাখিয়া গাছ ছাঁটিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গোলাপকে ছাঁটিবার ভিন্ন যেরূপ বিভিন্ন প্রণালী আছে, উদ্দেশ্য বিশেষে ছাঁটিবার জন্য সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী আছে। এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যিনি কার্য্য করিতে পারেন তিনি সিদ্ধ মনোরথ হয়েন। যে কোন জাতীয় গোলাপ হউক ছাঁটিবার পূর্বে ভৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অতঃপর তাহাতে যে সকল শুক ও রুগ্ন শাখা-প্রশাখা থাকে তাহাদিগকে এক্রূপে কর্তন করিতে হইবে যে, তাহারা পুনরায় না জন্মিতে পারে। যে সকল শাখা-প্রশাখায় ফুল হইবার আশা নাই কিম্বা যে সকল শাখা-প্রশাখা স্থানান্তর বশতঃ পরস্পর বিজড়িত হইয়া আছে, তাহাদিগকেও কাটিয়া ফেলিতে হইবে। আসল কথা—যে কর্তা দণ্ড বা শাখা-প্রশাখাকে রাখিতে হইবে, কেবল তাহাদিগকে রাখিয়া অপর সমুদয়কে কাটিয়া ফেলিয়া গাছকে হালকা করিয় দিতে হইবে। গাছের অবস্থা সম্বন্ধে তেজাল হইলে অধিক পরিমাণে ছাঁটা বিধেয় নহে, কারণ তাহা হইলে ছাঁটিবার পরে

যে সকল নূতন ফেঁকড়ি উৎপন্ন হইবে তাহার। অতিশয় তেজাল  
হইবে এবং তাহার ফলে উহার। ভাল বা অধিক ফুল দিতে সক্ষম  
হইবে না। হাইব্রিড-পার্পেচুয়াল, বোরবো প্রভৃতি যে সকল  
গোলাপের মূলদেশ হইতে সরল ছড়ি উদ্ভূত হইয়া থাকে  
তাহাদিগের ছড়ি সমূহের এক্ষণ স্থান অবধি কর্তন করিতে হইবে  
যে, সেখান হইতে যেম সুপুষ্ট শাখা উৎপন্ন হয় ও তাহাতে ভাল ফুল  
জন্মে। গাছের শাখায় যত চোক থাকে তৎসমুদায়ই ভাবী-শাখার  
মুকুল,—অবসর বা সুযোগাভাবে মুগ্ধ থাকে মাত্র। সেই সকল  
চোকের যে কোন চোককেই সজীব করিতে পারা যায়,—ইহা  
কর্তনকারীর ইচ্ছাধীন। যে চোকের উপরিভাগ কাটিয়া ফেলা  
যায়, সেই চোকই সর্ব প্রথমে মুখরিত বা জাগ্রত হইয়া উঠে—  
ক্রমে শাখা রূপে প্রকাশ পায়। সূতরাং অরণ রাখিতে হইবে যে,  
ইচ্ছা করিলে গাছের যে কোন স্থান হইতে নূতন শাখা উৎপন্ন  
করিতে পারা যায়, তবে ইহাও অরণ রাখা উচিত যে, সকল  
গ্রন্থি হইতে সমান তেজাল ফেঁকড়ি জন্মে না এবং সকল  
ফেঁকড়িতে সমগুণসম্পন্ন ফুল হয় না। ছড়ির সর্ব নিম্নভাগে  
যে গ্রন্থি থাকে, তাহা হইতে তাদৃশ তেজাল ফেঁকড়ি হয় না এবং  
তাহাতে যে ফুল হয়, তাহাও তত ভাল হয় না। দণ্ডের কচি  
ও অতিশয় রসাল অংশ হইতে যে শাখা জন্মে তাহা তেজাগ হয়  
কিন্তু তাহার নিম্নস্থ ২।৪ চোক হইতেও ফেঁকড়ি উৎপন্ন  
হয়। অধিক ফেঁকড়ি জন্মিলে ফেঁকড়িগণ নিস্তেজ হয় এবং  
তাহাতে ফুলের আশা বড় অল্পই থাকে। পক্ষও কচি—  
এতভয়বিধ চোকের মধ্যবর্তী যে করতী অঙ্গ পরিপক্ক মুগ্ধ থাকে  
তাহাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিমুগ্ধ, সুপুষ্ট অথচ হিংস্র

তাহারই উপরিভাগ কাটিয়া ফেলিতে হয়। মাঝখানের গ্রন্থিজাত শাখা তেজাল হয় এবং তাহাতে যে ফুল হয় তাহা উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল গ্রন্থি বৃক্ষের বহির্ভাগে অবস্থিত, তাহার বহির্ভাগে উদ্গত ও প্রসারিত হয়। এইজন্য বহির্গামী গ্রন্থির উপরে বাহাতে কাটিতে পারা যায় তৎপ্রতি বিশেষে লক্ষ্য রাখা উচিত। এ বিষয়ে লক্ষ্য হীন হইয়া ছাঁটিলে ভিতরের গ্রন্থি হইতে শাখা জন্মিয়া উদ্ভিদ মধ্যে বায়ু ও আলোক প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। বৃক্ষের অভ্যন্তর উন্মুক্ত থাকিলে তন্মধ্যে অবশ্যে বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে এবং সূর্যালোক ও উত্তাপ প্রবেশ লাভ করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত উদ্ভিদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য একান্ত প্রয়োজন। কেবল তাহাই নহে। উদ্ভিদের অভ্যন্তরাংশে যে সকল ফেঁকড়ি জন্মে, বায়ু ও রোদ্রাভাবে তৎসমুদায় সুপরিপক্ক হইতে পায় না, তন্নিবন্ধন ফুল প্রদান করিতে পারে না। এক্ষণে অকর্মণ্য শাখা-প্রশাখাকে জন্মিতে বা থাকিতে দিলে উদ্ভিদের শক্তি অপচয় হয়।

কম শীর্ণ গাছের শাখা-প্রশাখার সংখ্যা ও দীর্ঘতা হ্রাস করিয়া দেওয়া আবশ্যিক। ঈদৃশ গাছে শাখা-প্রশাখা অধিক থাকিলে তাহার আপনাপন ভরণপোষণ করিয়া উঠিতে পারে না, উপরন্তু অধিক গ্রন্থি থাকিতে দিলে, সেই সকল গ্রন্থি হইতে নূতন ফেঁকড়ি উদ্গত হইয়া গাছকে আরও জখম করিয়া ফেলে। গাছের ঈর্ষতা বা নিস্তুজতার অন্ততম কারণ—যথা পরিমাণ মূল্যের অভাব। অবশ্যই মৃত শিকড়ের পরিমাণ থাকিলে উদ্ভিদের রস বা আহাৰ্যের অভাব হয় না। শীর্ণ ও দুর্বল গাছ দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে, উহার পোষণোপযোগী যথা পরিমাণ

শিকড় নাই। একপাশে গেছে শিকড় যাহাতে অধিক হয়, তৎপ্রতি অগ্রে লক্ষ্য রাখিতে হয়। শিকড় যথেষ্ট থাকিলে গেছে অঙ্গ-সৌষ্টবের বৃদ্ধির জন্য ভাবনা হয় না। বৃহৎ পরি-  
বারকে সন্ধান আয়ের উপর নির্ভর করিতে হইলে সকলকেই কষ্ট পাইতে হয়। সেইরূপ অল্প মূল হইলে বিস্তৃত অবয়ব বৃদ্ধকে কষ্ট পাইতে হয়। উল্লিখিত সাধারণ নিয়ম কয়টা জাতি  
নিবিশেষে সকল প্রকার গোলাপেই প্রযুক্ত।

সাধারণতঃ বর্ষাকাল একবারে উত্তীর্ণ হইলে গোলাপ গাছ  
ছাঁটিতে হয়। বঙ্গদেশে সচরাচর আশ্বিন মাসের  
ছাঁটিবার সময় শেষভাগ পর্যন্ত বৃষ্টি হইয়া থাকে কিম্বা বৃষ্টি  
হইবার সম্ভাবনা থাকে স্মরণে রাখিয়া আশ্বিন মাস মধ্যে গোলাপ  
ছাঁটিবার জন্য ব্যস্ত হইবার আরম্ভক নাই, কার্তিক মাস হইতে  
আরম্ভ করা ভাল। দুই পাঁচ দিবস বিলম্ব হইলে ক্ষতি হয়  
কিন্তু তাড়াতাড়ি করিয়া কার্য্যারম্ভ করিবার পর বৃষ্টি হইলে  
অনেক কাজ পুনরায় করিতে হয়। যে সকল জেলায় বা প্রদেশে  
কার্তিক মাসেও বৃষ্টি হইয়া থাকে, তথায় আরও দিন কতক  
বিলম্ব করায় লাভ আছে। ভূমি ও বায়ুমণ্ডলের সিক্তাবস্থায়  
গাছ ছাঁটিলে অল্প দিন মধ্যেই তাহাতে বহু শাখা-প্রশাখা উদ্গত  
হয়। তদ্ব্যবন্ধন ছাঁটিবার একটা উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। গেছে  
বৃদ্ধিকে কিয়দিনের জন্য বাধা প্রধান করা—গাছ ছাঁটিবার  
অন্ততম বিশেষ উদ্দেশ্য। গাছ ছাঁটা গেলে তাহার রস-পরিষ্কারণ  
ক্রিয়া মধ্যে বিষম আন্দোলন উপস্থিত হয়। সেই আন্দোলন  
হয় হইয়া পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা আগত হইতে এবং পূর্ববৎ  
কার্য্যকারী হইতে কিছু সময় অতিবাহিত হয়। ছাঁটিবার দিন



হইতে পুনরেক্সমকাল পর্য্যন্ত উহার রুক্ষাবস্থা বলিতে পারা যায়, কারণ আহরণ ও বর্জন-ক্রিয়া এ সময়ে বহু পরিমাণে স্থগিত থাকে। বেহার, যুক্ত প্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশের স্বাভাবিক বারিপাত উভয় বঙ্গ ও আসাম অপেক্ষা অনেক অল্প বলিয়া প্রথমোক্ত স্থানের ভূমি ও আবহাওয়া শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়। পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া, বীরভূম, ছমকা, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি জেলায় খুলনা, ২৪-পরগণা, হাবড়া প্রভৃতি জেলার বারিপাত অপেক্ষাকৃত অধিক স্রুতরাং প্রথমোক্ত স্থানের জমি ও আবহাওয়া অনেক শুষ্ক। পাহাড়ী ও কঙ্করময় স্থানে বৃষ্টির জল প্রবাহিত হইয়া বহুদূরে চলিয়া যায় কিম্বা মৃত্তিকা মধ্যে পরিশোধিত হইয়া বহু নিম্নে গিয়া স্থান পায়। এজন্য ঈদৃশ স্থানে আশ্বিন মাসেও গাছ ছাঁটিতে পারা যায়।

জাতি বিশেষ গোলাপকে ছাঁটিবার সময়ের মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ আছে। হাইব্রিড-পার্পেচুয়াল, মস, বোরবো—এই কয় জাতীয়\* গোলাপকে সর্ব প্রথমেই ছাঁটিতে হয়। অতঃপর টী, ফেরারি, ডামস্ক, ও মস্ক জাতীয় গোলাপদিগকে অগ্রহাষণ বা পোষ মাসে ছাঁটিতে হইবে। রোজা ইণ্ডিকা, রোজা-ম্যাক্রো-কিলা বা বারসন্টদিগকে ছাঁটিবার আবশ্যক হয় না, কেবল গাছকে হালকা করিয়া দিলেই হইল। রোজ-এডওয়ার্ড (dog rose) আদৌ ছাঁটি সহ্য করিতে পারে না। অজ্ঞতা বশতঃ অনেকে ইহাকে হাইব্রিড-পার্পেচুয়ালের ন্যায় কার্তিক অগ্রহাষণ মাসে ছাঁটিয়া দিয়া থাকেন। রোজ-এডওয়ার্ড কর্তিত হইলে তাহাতে নূতন শাখার উদগম হয় এবং গাছে এত পুষ্প-মুকুল দেখা দেয় যে, তৎসমুদায় শঙ্কুটিত হইতে না পারিয়া

শুকঠিয়া যায়। ইহাদ্বিগকে না ছাঁটিলে ফাল্গুন মাসের শেষভাগ বা চৈত্র মাসের প্রথম ভাগ হইতে প্রচুর ও সুন্দর ফুল প্রদান করিতে থাকে এবং আশ্বিন মাস পর্যন্ত ফুল প্রদান করে বোরসন্ট জাতীয় গোলাপও ছাঁটা গেলে, রোজ-এডওয়ার্ডের ন্যায় ফুল প্রদান করতে পারে না। পৌষ-মাঘ মাসে ইহাদিগের শুক ও নীর্ণ পল্লব সমূহকে কাটিয়া দিতে হয় মাত্র।

ক্রমান্বয় বর্ষায় ভূমি কঠিন হইয়া যায়, অথচ ভূগর্ভ সিক্ত থাকে। গাছ ছাঁটিবার পূর্বে গোলাপের ক্ষেত্র, কৰ্তনের পটি বা চোকাঁকে উত্তমরূপে কুন্দাগিত করিয়া পূৰ্ণকার্য্য মৃত্তিকাকে চূর্ণ করিয়া দিতে হয় এবং সেই সঙ্গে

গাছের গোড়া খনন করতঃ শিকড় সমূহকে অনাবৃতাবস্থায় ২৩ সপ্তাহ কাল রাখিয়া দিতে হয়। গাছের গোড়া এরূপ করিয়া খনন করিয়া দিতে হইবে যে, শিকড় সমূহের চারিদিকে যেন উত্তমরূপে বায়ু ও রোজ লাগে। গোড়া হইতে মাটি অপসারিত হইলে গাছ মরে না, বরং শুদ্ধায়া তাহাদিগের উপকারই হইয়া থাকে। গোড়া খনন করিবার কালে এই মাত্র সাবধনতা আবশ্যক যে, মূল শিকড়গুলি যেন না কাটিয়া যায়। সুস্থ শিকড় কাটিয়া বা ছিঁড়িয়া যায় যাউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। সুস্থ শিকড় কাটিয়া ছিঁড়িয়া গেলে বহু নূতন সুস্থ শিকড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহা হউক, এইরূপে ২৩ সপ্তাহ কাল গোড়া অনাবৃত থাকিলে, গাছ বিবর্ণ হইয়া আসে, গাছ হইতে বহু পত্র স্থলিত হয়, এক কথায়, গাছ অনেকটা হ্রস্ব হইয়া পড়ে। গাছের এইরূপ অবস্থা হইলে বুঝিতে হইবে, গোড়া খনন করিবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। গাছের গোড়া

খনন করিয়া দিবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেকে কহিয়া থাকেন যে, শিকড় সমূহকে রৌদ্র, শিশির ও বাতাস থাওয়াইবার জন্য গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। পানাহারের ফল পুষ্টি ও শক্তি বৃদ্ধি। গাছের গোড়া খুলিয়া দিলে তাহা হয় না, বরং গাছের শক্তি হ্রাস হয়, গাছ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। গোড়া খুলিয়া দিবার উদ্দেশ্য—গাছকে কিছু দিনের জন্য নিস্তেজ করা।—গাছের বৃদ্ধি রোধ করা। এতদ্ব্যতীত উদ্দেশ্য মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও ফল এক হয়। তবে যদি কেহ বিপরীত বুঝিয়া দীর্ঘ কাল গোড়া খুলিয়া রাখিয়া দেন, তাহা হইলে গাছের পক্ষে সুবিধার কথা নহে, এই জন্য মূল উদ্দেশ্যের কথা ব্যাখ্যা করিলাম। যাহা হউক, গোড়া নগ্ন করিয়া দিবার পর বৃষ্টি হইলে আরও এক আধ সপ্তাহকাল বৃক্ষদিগকে ভদ্রবহায় রাখিয়া দেওয়া উচিত এবং গোড়ার মাটিকে পুনরায় উচ্চাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়, কারণ তাহা হইলে মাটির সরসতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। বৃক্ষমূল সমূহকে এই রূপে নগ্ন করিয়া দিবার পদ্ধতিতে ইংল্যান্ডিতে artificial wintering কহে। মূল খোদিত হইবাব অন্ততঃ দুই সপ্তাহ পরে অর্থাৎ বৃক্ষগণ অল্পাধিক নিস্তেজ হইয়া আসিলে পর ছাঁটিতে হয়। এক্ষণে ছাঁটিবার জন্য যে যে যন্ত্রের আবশ্যক অগ্রে তাহা দেখা যাউক।

গাছ ছাঁটিবার জন্য কাঁচি, ছুরী, করাত, চিমটা—এই চারি

প্রকার যন্ত্রের আবশ্যক হইয়া থাকে। গাছপাল  
যদি ছাঁটিবার জন্য স্প্রিং (Spring) সংযুক্ত সতন্ত্র

প্রকারের কাঁচি নির্মিত হইয়া থাকে। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ছাঁটিবার সময় অধিক বল প্রয়োগ করিতে হয় না এবং স্প্রিং

থাকিবার হেতু কর্তন-মাত্র ফলাদ্রয় আপনা হইতে খুলিয়া যায়। উক্ত কাঁচিকে ইংরাজিতে Pruning Secateurs কহে। ইহা দ্বারা সরু শাখা-প্রশাখা সহজেই কাটিতে পারা যায়, কিন্তু মোটা, পরিপক ও গুরু শাখাদিগকে কাটিবার জন্য বৃহজ্জাতীয় কাঁচি আছে এবং তাহাকে Pruning Shears কহে। ইহা দ্বারাও যথেষ্ট সকল ডালকে কর্তন করিতে না পারা যায়, তাহাদিগের জন্য করাত ব্যবহার করিতে হয়। ডগা কাটিবার জন্য ছোট কাঁচি ব্যবহৃত হয়, ইহাদিগকে pruning scissors কহে। গোলাপ গাছ ছাঁটিতে গেলে শরীরের নানাস্থানে বিশেষতঃ হস্তদ্বয়ে আতশয় কাঁটা ফুটিয়া যায়। সেই জন্য কঙ্কিত পল্লবদিগকে টানিয়া ফেলিবার জন্য কর্তকের বাম হস্তে একখানি বড় চিম্টা থাকা বিশেষ আবশ্যক। সকল যন্ত্রই তীক্ষ্ণ ও পরিচ্ছন্ন হওয়া স্পৃহনীয়। অতীক্ষ্ণ ও মরিচাগ্রস্ত যন্ত্র দ্বারা কর্তনে ব্যাঘাত ঘটে, বিলম্ব হয় এবং ডালপাল ফাটিয়া বা পিণিয়া যায়। তাহা ব্যতীত এরূপ যন্ত্রের দ্বারা কর্তন কালে কর্তকের হস্তে ব্যথা লাগে, ফলতঃ কর্তক অধিকক্ষণ কাজ করিতে সক্ষম হয় না। এই প্রসঙ্গে আরও দুই খানা যন্ত্রের নাম উল্লেখ করিয়া রাখি,— (১) গাছ কাটিবার ছুরী (Pruning knife), (২) চোক-কলম করিবার ছুরী (Budding knife)। গোলাপ গাছ রাখিতে হইলে এ দুই খানি যন্ত্র রাখাও আবশ্যক।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

ছাঁটিবার পূর্বে তাবৎ শুষ্ক, শীর্ণ ও অকর্মণ্য পল্লব ও ছড়িদিগকে কাটিয়া গাঁছকে হালকা করিতে হইবে, পূর্বা-  
ছেদন ধায়ে তাহা কথিত হইয়াছে। অতঃপর শ্রেণী  
স্থির করিয়া কর্তনীয় বৃক্ষের বর্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া  
কর্তন করিতে হইবে। ছাঁটিবার সময় গাছের নবোদগত,  
কোমল, অপরিপক্ক ও তেজাল ছড়ি সমূহকে বাদ দিয়া অপরাপর  
ছড়ি সমূহের অর্ধপরিপক্ক স্থানের বহির্মুখী 'চোক' অর্থাৎ শাখা  
মুকুল বা গ্রন্থি পর্যন্ত রাখিয়া, তাহার উপরিভাগ ঈষৎ হেলাইয়া  
কর্তন করিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, কর্তনীয় স্থানের শাখা-  
মুকুল কোন রূপে না আঘাত পায় কিম্বা সে স্থান ফাটিয়া বা  
পিশিয়া না যায়, সে বিষয়ে যেন বিশেষ লক্ষ্য থাকে। উক্ত  
স্থান ফাটিয়া বা পিশিয়া গেলে উপরিভাগ হইতে ক্রমশঃ শুষ্ক  
হইতে থাকে। সরল-শাখী গোলাপ ছাঁটিবার ইহাই প্রথম সূত্র।  
সকল গাছের সমান বৃদ্ধি নহে, সুতরাং ক্রোন গাছের গোড়া  
হইতে ২০ টী বা ৪৫ টী বা ৭৮ টী গ্রন্থির উপর ছাঁট  
পড়িয়া থাকে। যে সকল গাছ অতিশয় তেজাল, ও ছড়ি সমূহ  
৫৬ হাত দীর্ঘ, তাহাদিগের উপরিভাগ সাধামত কম করিয়া  
ছাঁটিবার চেষ্টা করা উচিত। ঈশ্বর গাহ অধিক ছোট  
করিয়া কর্তিত হইলে সমধিক তেজাল ও বহু শাখা সম্পন্ন হয়,  
তন্নিবন্ধন ফুল না হইলেও সম্ভাবনা কিম্বা যদিও ফুল হয়, তাহার  
আকার, গঠন ও সৌন্দর্য্য তাদৃশ মনোরঞ্জক হয় না। পূর্বে

বৎসরের কুর্জিত শাখা থাকিলে তাহাদিগকে মূল ঘেসিয়া এক্রপে কাটিয়া দিতে হইবে যে, তাহারা পুনরায় না জন্মিতে পারে। প্রথম বৎসরের গাছ এবং নিস্তেজ ও স্বভাবতঃ অল্পশাখীগাছদিগকে, অধিক শাখা-সম্পন্ন হইতে দেওয়া উচিত নহে, এজন্ত উহাদিগের ২০ টী মাত্র দণ্ড রাখিয়া অপর গুলিকে গোড়া ঘেসিয়া ছেদন করিতে হইবে। অনন্তর যে কয়টী দণ্ড থাকিবে, তাহাতে ২০ টী মাত্র 'চোক' রাখিয়া অবশিষ্টাংশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে। আবশ্যক বোধ করিলে দণ্ডের ও চোকের সংখ্যা আরও হ্রাস করিয়া দেওয়া কর্তব্য। এ প্রকার গাছের,—ফুলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, গাছ যাহাতে সবল ও সতেজ হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। মায়াবশতঃ লোকে অধিক করিয়া ছাঁটিতে পারে না, তাহার ফলে দেখিতে

৬ নং চিত্র



পাওয়া যায় যে, ছেদনের পর বহু সংখ্যক শীর্ণ ও অকর্মণ্য ক্ষুদ্র ফেঁকড়ি জন্মে এবং হয় তাতার অধিকাংশ পোষণভাবে শুকাইয়া যায়, না হয় তদবস্থায় থাকিয়া

বৃক্ষের অপরাপর অংশকে হীনতেজ করিয়া ফেলে। অস্ত্র হাতে লইয়া নিশ্চয় হইয়া ছেদন কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। মমতা প্রদর্শন করিতে গেলে, পরমায়ু থাকিতে অনেক রোগীকেই ইহলোক পরিভাগ করিতে হয়। দণ্ডের সংখ্যা হ্রাস করিয়া দিলে মূলদেশ হইতে তেজাল নূতন শাখা জন্মে ও তাহাতে যে পুষ্প উৎপন্ন হয় তাহা পূর্ণাকার ও লাবণ্যবৃত্ত হইয়া থাকে। তেজাল গাছে বহু সংখ্যক দণ্ড থাকিতে দিলে তাহাতে ফুলের সংখ্যা অধিক হইতে পারে কিন্তু সে সকল ফুল ঘন-দল হইতে

পারে না,—উৎপন্ন ফুলের ‘নাই’ অর্থাৎ ‘নাভী’ দেখিতে পাওয়া যায়।\* যে সকল গোলাপের নাভী দৃষ্টিগোচর হয়, তাহারা নিকট ফুল বলিয়া জানিতে হইবে। অনেক ঘন-দল গোলাপের নাভী দৃষ্টি-গোচর না হইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের দলের ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কোচভাব দেখিলে তাহারা যে অসম্পূর্ণ ও বিকৃত পুষ্প তাহা বুঝিতে পারা যায়। কচি ও রসাল শাখাদিগকে ছাঁটিলে তাহাদিগের অবশিষ্ট চোক সমূহ বিকশিত হইয়া উঠে ও তাহাতে বহু শাখা উৎপন্ন হয়। ঈদৃশ ছড়িকে আদৌ কর্তন করা উচিত নহে।

মস, দামাস্ক, ও মস্ক জাতীয় বৃক্ষগণকে হাইব্রিড পার্পেচুয়ালের সিয়মানুসারে ছাঁটিতে হইবে।

‘টী’ জাতীয় গোলাপ বহু শাখা-প্রশাখা-সম্পন্ন ও বিস্তৃত গাছ। ইহাদিগের পুরাতন ডগার শিরোভাগ মাত্র অল্পপরিমাণে ছাঁটিতে হয়। ইহাদিগকে ছাঁটিবার সময় বিশেষ সাবধানতার আবশ্যক। একেই ইহারা বহু-শাখী ও ঝাড়াল গাছ, তাহাতে অনবধানতাসহকারে কর্তিত হইলে আরও ঘন হইয়া পড়ে। ‘টী’ জাতীয় গাছে বহু অকর্মণ্য ফেঁকড়ি থাকে, তাহাদিগের সংখ্যা সাধ্য মত হ্রাস করিয়া দিতে হয়।

নরসেট জাতীয় গাছ মাত্রেরি অতিশয় দীর্ঘ-শাখী ও লতিকা

\* পুষ্পের মধ্যস্থলে যে গোলাকার খালার স্তায় স্থান হইতে পরাগ কেশর সমূহ উৎপন্ন হয়, তাহাকে ‘নাই’ বা ‘নাভী’ (disc) কহে। যে সকল পুষ্পের দল অতিশয় ঘন তাহাদিগের মধ্যে নাভী দৃষ্টিগোচর হয় না। এক-ক্রেদীল পুষ্পে নাভী একবারেই অদৃশ্য থাকে। ঘন-দল পুষ্পের নাভী আদৌ দেখা যায় না।

স্বভাব হয়। মূল দণ্ডদিগকে অশৃঙ্খলে পরিচালিত করিতে পারিলে ১০২০ হস্তের ও অধিক দীর্ঘ হইতে পারে। ইহারা স্বভাবতঃ তেজাল অথচ কোমল-প্রকৃতি। টী-জাতির জ্বার ইহাদিগের বহু ফেঁকড়ী উৎপন্ন হয়। ছাঁটিবার কালে এই সকল শীর্ণ ফেঁকড়িদিগকে নষ্ট করিয়া পরিপক্ক শাখা সমূহের শেবাগ্রভাগ কাটিয়া দিতে হয়। যে সকল দণ্ডে ফুল হয় মাই তাহাদিগকে কাটিবার আবশ্যক হয় না। যে সকল দণ্ডে বা শাখা-প্রশাখার ফুল হইয়া যায়, তাহাদিগের শেবাগ্রভাগ জ্বার কাটিয়া দিলে নূতন শাখা উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে পুনরায় পুষ্পের আবির্ভাব হয়। এখানে বলিয়া রাখি,—নয়সেট জাতীয় গোলাপের জন্ত অবলম্বনের আবশ্যক। বিনা অবলম্বনে ইহারা দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকিতে না পারিয়া পার্শ্বভাগে হেলিয়া পড়ে। এইরূপে যে সকল ডাল বা ছড়ি হেলিয়া পড়ে তাহাদিগের গাভ্রস্থ প্রায় তাবৎ পত্র-মুকুলই উল্লসিত হয়। সে সকল ফেঁকড়ি অতি ক্ষুদ্র ও কণী হইয়া থাকে কিন্তু প্রত্যেক ফেঁকড়িতেই দুই একটা ফুল হয়। এতদ্বারা মূল শাখাগণ কদাকার ও ভারি হইয়া পড়ে এবং সমগ্র গাছের শক্তি নষ্ট হয়। জেত্র নয়সেট গোলাপকে খুঁটি, শুভ্র, জাক্রি বা প্রাচীর গায়ে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিতে হয়। নয়সেটকে দাঁড়া-গাছ (Standard) করিতে হইলে মূলোদ্গত ৩৪টা তেজাল দণ্ডকে সরলভাবে বদ্ধিত ও পক্ষ হইতে দিতে হইবে। ইতোমধ্যে অপর যে সকল পল্লব বাহির হইবে তাহাদিগকে গোড়া ঘেসিয়া কাটিয়া দিতে হইবে। অতঃপর উল্লিখিত দণ্ড কয়টার অর্দ্ধ-পক্ষাংশ অবধি রাখিয়া উপরিভাগ কাটিয়া ফেলিতে হইবে। এক্ষণে কর্ত্তিত দণ্ডের তাবৎ গ্রন্থি হইতে নূতন শাখা উৎপন্ন



হইবার সম্ভাবনা আছে। অনেক শাখা উৎপন্ন হইলে কোন শাখাই তেজাল ও দীর্ঘ হইবে না,—ইহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। বাহাতে অধিক শাখা কুটিতে না পারে, সেজন্য উপরিভাগের ৩৪টি মাত্র 'চোক' রাখিয়া অবশিষ্টগুলিকে উত্তমরূপে রগড়াইয়া দিতে হইবে। এরূপ করিলে রগড়ান চোক হইতে আর শাখার উদ্গমন হইবে না, অধিকন্তু উপরিভাগের সংরক্ষিত ৩৪টি চোক হইতে যে শাখা উৎপন্ন হইবে তাহার দীর্ঘ, তেজাল ও সুপুষ্ট হইবে, এবং মূল শাখাগণও তাহাদিগের ভরে হেলিয়া পড়িবে না।

পরী-গোলাপ বা ফেরারি-রোজ অতি ক্ষুদ্র জাতীয় গাছ। ইহাদিগের অকর্মণ্য ফেঁকড়ি ও পুন্পিত ডগার উপরিভাগ কেবল কাটিয়া দিতে হয় মাত্র।

হাইব্রিড পার্শ্বেচুরাল জাতীয় মধ্যে কতকগুলি অতিশয় তেজাল ও বুদ্ধিশীল গাছ আছে, তাহার হেঁদিত বাঁড়া গাছের প্রতীকার হইলে পুন্প প্রদান করিতে পারে না। আবার অনেক গাছ মৃত্তিকার অত্যধিক উর্বরতা হেতু এত বাঁড়াইয়া যায় যে পুন্প ধারণ করিবার দিকে আদৌ রত হয় না। ঐদৃশ গোলাপকে পুন্পিত করিতে হইলে গাছ না ছাঁটিয়া দীর্ঘ ও তেজাল দণ্ডদিগের শিরোভাগ রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া ভূ-সংলগ্ন করিয়া রাখিতে হয়। এরূপ করিলে উক্ত দণ্ড সমূহের বক্র স্থান হইতে নূতন শাখা উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে পুন্পাগত হয়। পুন্পকাল অতীত হইলে নিম্নভাগের সরল অংশ রাখিয়া অবশিষ্ট অংশকে কাটিয়া দিতে হয়। অতঃপর—

দ্বিতীয় উপায় এই যে, গাছের গোড়ার মাটি যথানিয়মে খনন করিয়া ছই একটি মূল-শিকড় কাটিয়া অপরাপর গাছ

অপেক্ষা ২১১ মণ্ডাহ অধিক দিন মূল সমূহকে অনাবৃত্তাবস্থায় রাখিতে হয়। ভুল্লি নিভাস্ত রসা হইলে গাছের গোড়ার অধিক দূর ব্যাপিয়া মাটি অপসারিত করিয়া দিতে হয়। এতব্যতীত আর এক উপায় এই যে,—

প্রথমবার যথা নিয়মে ছাঁটিয়া দিবার পরে শাখা-প্রশাখা জন্মিয়া জীবৎ দৃঢ় হইলে তাহাদিগকেও অল্পাধিক ছাঁটিয়া দিবে। এইরূপে ছইবার ছাঁটা গেলে গাছের তেজ অনেক হ্রাস প্রাপ্ত হয়, অল্প দিকে বহু সংখ্যক শাখা উদ্ভূত হয়। উক্ত ছই কারণে বর্দ্ধনশীলতা আপাততঃ স্থগিত হইয়া ফুল ধারণ করিবার দিকে উহাদিগের গতি প্রত্যাবর্ত্তন করে। যে সকল গাছ ষাড়াইয়া যায়, তাহাতে সার দিবার আবশ্যক করে না, বরং সার প্রদান করিলে আরও ষাড়াইয়া যায়, তবে ফুলের বর্ণাদির উন্নতি কল্পে উদ্ভিজ্জ ফার প্রদান করিতে পারা যায়।

গোলাপ-গাছ পালকের কথা শুনে, একথা বলিলে অনেকে বিজ্ঞপ মনে করিতে পারেন কিন্তু বাস্তবিক ইহারা গোলাপের প্রভুর বাসনা পূর্ণ করিয়া থাকে। এরূপ আজীবন আর কোন বৃক্ষ আছে বলিয়া মনে হয় না। সময়ে অসময়ে—যখন ইচ্ছা তখন ইহাদিগকে—অন্ততঃ অধিকাংশ গোলাপকেই পুষ্প প্রদান করাইতে পারা যায়। শীতকালে একবার ফুল প্রদান করিয়া ইহারা কিঞ্চিৎ কালের জন্য বিশ্রাম লয়। অতঃপর জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে বা আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগে ছই এক পসলা বারিপাত হইলেই উহারা আর এক দফা ফুল প্রদান করিয়া থাকে। এ সময়ের ফুল তাদৃশ বড় বা ঘন দল হয় না—তাহা ফুলের দোষ নহে,—

প্রাকৃতিক কারণ ইহার মূল। বর্ষাকালে মৃত্তিকা জমাট বাধিয়া যায়, নিরন্তর রস থাকে, জমিও আগাছায় পূর্ণ থাকে—এই কারণে ফুলের গুণ ঢাকা পড়িয়া যায়। কিন্তু যথাযোগ্য পরিচর্যা প্রাপ্ত হইলে তদনুরূপ ফলও পাওয়া যায়। ‘কঁাচির মুখে ফুল’ শীর্ষক গ্রন্থকার লিখিত একটা প্রবন্ধ বঙ্গবাসীতে ৩০শে কার্তিক সন ১৩০৮ সালে প্রকাশিত হয়, এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করা গেল:—

বঙ্গবাসী, ৩০শে কার্তিক, সন ১৩০৮ সাল।

“আমাদিগের আরোজন মত অনেক সময়ে ফুল পাওয়া যায় না, কিম্বা বাহা পাওয়া যায়, তাহাতে সন্তোষ হয় না। আমার এমন অনেক ফুলও আছে, বাহা আদৌ পাওয়া হুঁশট হইয়া পড়ে। ফুলের টানাটানিটা আমরা সচরাচর আর অনুভব করিতে পারি না। যখন কোনরূপ অনটন পড়ে তখন অস্তিত্ব পুষ্প দ্বারা সে অভাব পূরণ করিয়া লই।”

“বৎসরের মধ্যে ছুইটা সময় আমরা ফুলের বিশেষ অভাব অনুভব করি, প্রথম,—ভূর্গোৎসবে; দ্বিতীয়,—বড় দিনের পক্ষে। শেষোক্ত পক্ষে ফুলের অনটন হইলে হিন্দুর তাহাতে বিশেষ আসিয়া যায় না; তবে ভূর্গোৎসবের কালে ফুলের অভাবটা বড়ই অভাব বলিয়া মনে হয়। কথার বলে ভূর্গোৎসবের ব্যাপার। ভূর্গোৎসবে উনকুটি-চৌবট্টির বত আরোজন করিতে হয়, এমন আর কোন উৎসবে করিতে হয় না। আরোজন সব ঠিক, ধূমধামের ও চুড়ান্ত, বাড়ীও লগ্নয়ন; কিন্তু দেবার পুঞ্জার স্তম্ভ সে কুহুম তুপ কৈ? পুষ্পের বিবিধ রকম কোথায়? আর ফুলের যে মনোহারিণী ওজ্বলা বা আরামদায়িনী আশ্রয়ই বা কৈ? এই বিশিষ্ট সময়ে ফুলের যে অভাব হয়, ফুলের যে রকম ও মনোহারিত্বের অভাব হয় তাহার বিশিষ্ট কারণও আছে। বর্ষাঋতুসময়ের সঙ্গে আর লকল উত্তিগেই নবশক্তির সঞ্চার হয়। কলত: সে সময়ে তাহারা অনিতভেজে বাড়িতে বাড়িতে পুষ্প প্রদানোমুখী হইয়া পড়ে এবং সেই সময় হইতে তাহাদিগের বৃদ্ধি স্থিরভাবে ধারণ করে,—

পুষ্প ধারণ শক্তি আপাততঃ কিছু দিনের জন্য হ্রাসিত হইয়া যায়। সংসারে সকল কার্যেরই একটা শৃঙ্খলা আছে, নিয়ম আছে, এবং সেই নিয়মের বশীভূত হইয়াই এই জগৎ সংসার চলিতেছে। উদ্ভিদ এক সময়ে বাড়ে,— এক সময়ে বিরাম লাভ করে। গোলাপনার সে বিরাম, তাহার কতকটা ঔত্তিমিক নিয়মবশে, আর কতকটা ঋতু পরিভ্রমণের ফলে সংঘটিত হইয়া থাকে, কিন্তু যে কারণেই হউক; মনুষ্য চেষ্টা সে কারণ বিদ্রুত করিতে যে অসমর্থ, তাহা নহে। হিন্দুর দেবসেবার উপযোগী যত প্রকার পুষ্প দেখিতে পাওয়া যায়, গোলাপ, টগর, গন্ধরাজ, করবী, হলগন্ধ, জবা, রজনী-গন্ধা, কাকিন, কলিকা, বৈজয়ন্তী বা সর্কজরা, অপরাঞ্জিতা, বেগ, হুই মল্লিকা, চামেলী, নেওয়ার, মেকালিকা ইত্যাদি প্রধান, কিন্তু এতৎ সমুদায় গ্রীষ্ম হইতে বর্ষাকাল মধ্যে আপনাপন আবহবৃত্তিক বৃদ্ধি ও পুষ্প ধারণ কার্য সমাধা করিয়া শরতের শেষ হইতে বিশ্রাম লাভে ক্রম ক্রমে অগ্রসর হয়। আর দুর্গোৎসব ও প্রায় শরতের শেষ বা হেমন্তের প্রথমেই হইয়া থাকে। এই আশ্বিন বা কাশিক মাসে একেই উদ্ভিদগণ ক্রান্তির পরে শ্রান্তি লাভ করিতে থাকে তাহাতে আবার সেই সময়ের শৈত্য ও শিশিরপাত হেতু আরও নির্জীবতাব ধারণ করে; কাজেই দুর্গোৎসবকালে ফুলের অনটন হয়, ফুলের বাজারও স্তব্ধ হয়।

“দুর্গোৎসবকালে ফুলের প্রাচুর্য্য রাধিতে হইলে উদ্যানকের প্রধান কার্য—গাছের পুষ্প-প্রদায়িনী শক্তিকে কৃত্রিম উপায়ে রোধ করা। কার্যটি অতি সহজ হইলেও ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তির কার্য। অনভিজ্ঞের হস্তে কলান্তর হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। আবার ঘাসের শেব ভাগ হইতেই পল্লিকা দেখিয়া দুর্গোৎসবের দিন অরণ করিয়া রাধিতে হয়। বলা বাহুল্য যে হিন্দুমাত্রই তাহা অরণ রাখেন কারণ এমন উৎসব শু আর নাই। দুর্গোৎসবের দিন হইতে ঠিক ৩০ দিবস পূর্বে গাছের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। এই সময় সম্ভাব্যতঃ গাছে প্রচুর ফুল হইয়া থাকে। এইক্ষণ হইতে উহাদিগের পুষ্প সম্ভাবী শাখা-প্রশাখার নিরোভাগ অল্প পরিমাণে ছাটিয়া দিতে হইবে। এইরূপ ভগ্ন কাটিয়া বেগরাকে ইংরাজিতে ‘টপিং’ (Topping) বলে। টপিং

করিলে হেদিত শাখা-প্রশাখার নিম্নস্থিত চোকু হইতে কুঁড়ি কুঁড়ি শাখা বহির্গত হইতে থাকে এবং তাহারই শিরোভাগে ফুল দেখা দেয়। গাছে যদি পূর্বদিনের ৮-১০ দিন পূর্বে কুঁড়ি দেখা দেয় এবং যদি দুই চারি দিবসের মধ্যে ফুটিয়া বাইবার সম্ভাবনা বোধ হয়, তাহা হইলে এই সকল কুঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। সে সময়ে ইতস্ততঃ করিলে চলিবে না। অনেক যত্ন-বিস্তৃত কুঁড়ি প্রস্তুত হইতে আট দশ দিন সময় লাগে, সুতরাং এরূপ ফুলে কুঁড়ি ভাঙ্গিয়া না দেওয়াই উচিত। যদি দুই মাসেরও কম সময় থাকে, তাহা হইলে ডগা না কাটিয়া কেবল কুঁড়িগুলিকে ডগা সমেত কাটিয়া দিতে হইবে। বিলম্বে ডগা কাটিয়া দিলে তাহাতে ফুল আসিতে দুর্গোৎসব অতীত হইয়া যাইবে। বিগত বৎসর দুর্গোৎসবের ঠিক দেড় মাস অর্থাৎ পর্যভ্রমণ দিবস পূর্বে আমি কার্য্যারম্ভ করি। আমার কার্য্যপ্রণালী কিছু স্বতন্ত্র ছিল। আমি যে কেবল গাছের ডগা কাটিয়াছিলাম তাহা নহে, অনেক পুরাতন শাখাকে একবারে গোড়া ঘেসিয়া কাটিয়া দিই, অনেক শাখা-প্রশাখার কচি অংশকেও কাটিয়া ছোট করিয়া দিই। এইরূপে কার্য্যের স্বত্রপাত করিবার পর হইতে গাছে ক্রমগত মুহূর্ত্ত আসিতে লাগিল এবং সেই কুঁড়ি ভাঙ্গিবার জন্তই দুই তিন জন মালীর কার্য্য নিশ্চিষ্ট হইল। যত দিন বাইতে লাগিল ততই অধিক পরিমাণে ফুল আসিতে লাগিল এবং এমন হইয়া পড়িল যে, বুধ বা পুশ্যোদাসের গতিরোধ হয় না। তখন মাটিতে 'বো' পাইলেই গাছের গোড়া খুঁড়িয়া উলট-পালট করিবার ব্যবস্থা করিলাম।

উদ্দেশ্য,—মাটির রসটাকে কতক পরিমাণে শুষ্ক করিয়া ফেলা। অবশেষে পূর্বদিনের পাঁচ ছয় দিবস পূর্ণ হইতে ফুল বা কুঁড়ি কাটা হুগিত করিলাম। কলতঃ পূজার কয়দিন প্রভূত পরিমাণে ফুল পাওয়া গেল।

“বড় দিনের সময় ফুল—বিশেষতঃ গোলাপ ফুল—পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে, তাহার কারণ কৃত্তিক মাসেই মচরাচর গোলাপ গাছ ছাঁটী গিয়া থাকে। গোলাপ গাছ ছাঁটীবার সময় কেবল যে তাহাদিগের শাখা প্রশাখা ছাঁটীয়া দিয়া লোক নিশ্চিন্ত হয়, তাহা নহে। তাহাদিগের গোড়া হইতে সমূহ পরিমাণে মাটি জুলিয়া দিয়া ফুল শিকড়দিগকে হিম ও রৌদ্র লাগাইতে

হয়। একদিকে শাখা প্রশাখা ছেদিত হয়, অন্য দিকে আবার বই শিকড় কাটা যায়, শিকড় সকল অনাবৃত থাকে, সুতরাং গাছগুলি একবারে শুকন হইয়া পড়ে ও পুণ্য ধারণোপযোগী হইতেও বিলম্ব হয়। বড় দিনের সময়, ফুলের বাজার বড় চড়া থাকে ; এমন কি খুঁটমাস-ঈদের দিন সন্ধ্যার সময় কাঁড়ারে ফুল একবারে পাওয়া যায় না। যে সকল দোকানদার সন্ধ্যা পর্যন্ত ফুল রাখিতে পারে, তাহার। একটা ফুল আট আনা হইতে এক টাকাত্তেও বিক্রয় করিয়া থাকে। পুণ্য ব্যবসারীদিগের পক্ষে ইহা একটা বিশেষ লাভের চিন। এমন দিনে সমধিক পরিমাণে ফুলের ঘোগান দিতে না পারিলে ব্যবসারের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি বলিতে হইবে। ফুলের ঘোগান বধেই পরিমাণে রাখিতে হইলে গাছগুলিকে কার্তিক মাসে ওরূপ ভীষণভাবে না ছাঁটিয়া, শাখাপ্রশাখার উপর ছাঁটিয়া দিলে ভাল হয় এবং সেই সঙ্গে বাহাতে কার্তিক অগ্রীম মাসে গাছে আদৌ না ফুল ধরিতে পারে, তাহার জন্য কুঁড়ি কাটিয়া দেওয়াতে লাভ আছে। ইহাতে ফুলের পরিমাণ অধিক হইবে। আর সেই সকল ফুলকে বড় ও উজ্জল বর্ণের করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়ার তরল-সার দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। গাছের গোড়ার শিকড় আদৌ বাহাতে বিচলিত হইতে না পার, তাহাযে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক,—শিকড় ছাঁটিয়া দেওয়া ত দুরের কথা। যে প্রণালীতে আজ কাল গোলাপ গাছ ছাঁটা গিয়া থাকে তাহাতে বড় দিনের সময় ফুল পাইবার কোন আশা করা বাইতে পারে না।”

\* \* \* \* \*

কাটিবার গুণে গাছের আকার যেমন সুঠাম ও তেজাল হয়, কাটিবার দোষে সেইরূপ বৃক্ষগণ কদাকার বিকৃত গাছের পুনরুদ্ধার অধিক পরিভাপের বিষয়,—গাছের অকালবার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়। গাছের জাতি বিচার বা অবস্থা প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সকল গাছকে একই প্রণালীতে ছেদন করিলে

একশ হওয়া অবশ্যস্বাভাবী। তাহা ব্যতীত অনেক দলে নীর্ণ শাখা ও অকর্মণ্য ফেঁকড়িদিগকে আদৌ কর্তন করা হয় না— ইহা হইল গোলাপ গাছ নষ্ট হইবার প্রধান কারণ। ঈদৃশ লম্বা-প্রান্ত গাছগুলির নীচ পুনরুদ্ধার না করিলে অল্পদিন মধ্যে তাহারা উদ্ভিদ-লীলা সাক্ষ্য করে। সেই সকল গাছকে একবারে গোড়া বেষিয়া কাটিয়া যথাবিধি লালন-পালন করিলে পুনরায় তাহাদিগের মূলদেশ হইতে নূতন ও তেজাল দণ্ড উৎপন্ন হয়। অতঃপর নিরন্তর লক্ষ্য রাখিলে আর তাহারা কদাকার হইতে পায় না। প্রত্যেক গাছের আকৃতি বাহাতে মননরঞ্জক হয়, বার্ষিক-কৃষ্টি উদ্ভানদ্বারী তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

## সপ্তম অধ্যায়

—:০:—

ছাঁটিবার পূর্বে যে সকল গাছের গোড়া খোদিত হইয়া আছে এক্ষণে তাহাদিগের গোড়ায় সার প্রদান করিতে সার প্রদান হইবে। প্রত্যেক গাছে কি পরিমাণ সার দিতে হয় তাহা উদ্ভানকের বিবেচনার উপর নির্ভর করে। সার প্রয়োগ সম্বন্ধে প্রথম কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অধিক সার দিলেই যে অধিক উপকার পাওয়া যাইবে, তাহা নহে। উদ্ভিদগণ অতিশয় দীর্ঘতা সহকারে সার আহরণ করে, সুতরাং একবারে অধিক সার দিলে তাহার অধিকাংশ অপচয় হইয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে সার দেওয়া

ভাল, কারণ তাহা হইলে সার অধিক অপচয় হইতে পারি না।  
উভয়ের যে পরিমাণ সারের প্রয়োজন, যে পরিমাণে উহার  
আহরণ করিতে পারে, তাহাই উহার আহরণ করিবে,  
অবশিষ্টাংশ মাটিতেই পড়িয়া থাকিবে।

তেজাল গাছে অধিক তেজাল বা অধিক পরিমাণে সার  
প্রদান করিলে গাছ আরও তেজাল হইয়া উঠে, প্রত্যেক গ্রহি  
হইতে নূতন শাখা ও ফেঁকড়ির উদ্গম হয়, তন্নিবন্ধন ফুল বড়  
হইতে পারি না, ফুলের পরিমাণও অধিক হয় না। অতঃপর  
৪ নং চিত্র খরঁকা, শীর্ণ ও নিস্তেজ গাছে অধিক সার দিলে



বিশেষ কোন ফল হয় না, কারণ তাহাদিগের  
শিকড় এত অল্প যে, তত সার আহরণ করা  
তাহাদিগের পক্ষে একবারেই অসম্ভব; তাহা ব্যতীত

সমধিক সার আহরণ করিবার তাহাদিগের প্রয়োজন হয় না।  
এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রথমোক্ত গাছে ৫০, মাঝারি  
গাছে ৩৪, এবং ছোট ও দুর্বল গাছে ২৩ মুষ্টি সার দিলেই  
চলিতে পারে। সার তেজাল ও পুষ্টিকর হইলে আরও অল্প  
পরিমাণে দিলে চলিতে পারে। ৫০ মুষ্টি নিস্তেজ বা ঠাণ্ডা  
সার অপেক্ষা এক মুষ্টি অধিক কি,—অর্দ্ধমুষ্টি তেজাল সার দ্বারা  
অধিক উপকার পাওয়া গিয়া থাকে। এক কুড়ি গোবর বা  
এক সের সর্বপ বা রেড়ীর পিষ্টক অর্থাৎ খইল অপেক্ষা দুই তিনগুণ

---

অতিশয় পুরাতন পলিত সারকে ঠাণ্ডা-সার কহে। পুরাতন গোবর  
১১ ও সারের স্তম্ভত।



অন্ধি-চূর্ণসায়বান পদার্থ। সায় বিশেষে পরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে।

বে কোন সায়ই হউক, তাহা ঠাণ্ডা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। টাটকা সায় মাত্রেই অস্বাভাবিক উত্তাপজনক। এরূপ সায় প্রদান করিলে তাহ যুক্তিকা মধ্যে গিয়া উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং যাবৎ উত্তমরূপে গলিয়া না যায়, তাবৎ উহা হইতে উত্তাপ বাহির হইতে থাকে। মাটির ভিতর সায়ের এইরূপ উত্তাপ জন্মিলে বৃক্ষগণের 'ঝান' খাইয়া যাইবার সম্ভাবনা, অনেক স্থলে মরিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। ঝান-খাওয়া-গাছ মরিয়া না গেলেও কিছু দিনের জন্ত পিছাইয়া পড়ে। বিগলিত সায় উত্তপ্ত হয় না, অথচ যুক্তিকার সহিত সংযুক্ত হইবার পরই উদ্ভিদের ব্যবহারে আসে।\*

সায় দিবার পর যুক্তিকাকে সায়ের সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া লইতে হয়। মাটির সহিত সায় উত্তমরূপে মিশিয়া গেলে উদ্ভিদের সকল শিকড় সমভাবে তাহা আহরণ করিতে সমর্থ হয়। মাটি ও সায় উত্তমরূপে মিশ্রিত না হইলে কোন স্থানে অধিক আবার কোন স্থানে অল্প সায় পড়ে, ফলতঃ সকল শিকড় তাহা আহরণ করিতে পারে না। সায়কে এইরূপে মিশাইয়া দিলে সায় অপচয় হইতে পার না এবং অল্প সারে কার্যোদ্ধার হইয়া থাকে, ইহাও বিবেচনার বিষয়।

সায় প্রদান করা হইলে সকল গাছের গোড়ার থালা বাঁধিয়া সমগ্র ক্ষেত্র, পটি বা চৌকাকে চোরস করিয়া দিতে হয়। অতঃপর গাছে জল সেচনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

---

\* সায় প্রস্তুত করিবার প্রণালী সংকৃত 'কৃষিক্ষেত্র' নামক পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে।

সার প্রদান করিবার পর বাবৎ জল সেচন করা ন্ম যায়,  
 তাবৎকাল উদ্ভিদগণ সার আহরণ করিতে পারে  
 জল সেচন না। জল সংযুক্ত হইলে সার ক্রমশঃ আরও  
 বিগলিত হইয়া উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী হয়। অল্প সংখ্যক  
 গাছ হইলে কিম্বা স্থানে স্থানে গাছ রোপিত হইয়া থাকিলে  
 কোন পাত্র দ্বারা জল সেচন করিতে হয় কিন্তু গোলাপ-ক্ষেত  
 বিস্তারিত ও বহু বৃক্ষ পূর্ণ হইলে সিউনী, ডোম্বা-কল বা মোট দ্বারা  
 জল উত্তোলন করিয়া জমিকে প্লাবিত করিয়া দিতে হয়।  
 প্লাবনের দুই চারি দিবস পরে মাটিতে 'যো' হইলে ক্ষেত্রকে  
 একবার কুদালিত করিয়া মৃত্তিকা চূর্ণ করিয়া দেওয়া আবশ্যিক।  
 জল সেচনের পর চুপ-চাপ বসিয়া থাকিলে মাটি ক্রমশঃ ফাটিতে  
 থাকে, তন্নিবন্ধন ভূগর্ভে রৌদ্র, আলোক ও বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া  
 ভিতরের অধিক দূরের পর্য্যন্ত মাটি শুষ্ক করিয়া দেয়, গাছের  
 গোড়াকে ও মূল্য মূলদিগকে মাটিতে চাপিয়া ধরে, ফলতঃ  
 উদ্ভিদগণ সম্যকরূপে আহরণ করিতে না পারিয়া দিন দিন  
 নিস্তেজ হইতে থাকে, সুতরাং যতবার গাছে জল সেচন  
 করা হউক, ততবারই প্রথম 'যো' পাইলেই, গাছের গোড়ার  
 মাটিকে বিচলিত ও চূর্ণ করিয়া দিতে হয়। এতদ্বারা আরও  
 বিশেষ লাভ এই যে, ঘন ঘন জল সেচন করিতে হয় না।\*  
 বিনা জলে গাছ সহজে মরে না। গোড়ার মাটি চূর্ণীকৃত ও  
 আলগা থাকিলে যৌগিক আকর্ষণে ভূগর্ভস্থ রস নিম্নত উপরি-

---

\* সংস্কৃত 'মৃত্তিকাওষ' নামক পুস্তকে এ বিষয় বিগতরূপে আলোচিত  
 হইয়াছে।

ভাগে অঙ্গিয়া উদ্ভিদের ব্যবহারের জন্ত যেন অপেক্ষা করিতে থাকে। উদ্ভিদে সার প্রদান বা জল সেচন করিয়া আমা [প্রকৃতি দেবীর সাহায্য করি,—উদ্ভিদকে সচ্ছন্দতা প্রদান করি মাত্র।

প্রথম জল সেচনের দিন হইতে ৮।১০ দিনের মধ্যে বৃক্ষগণের পত্র-মুকুল অর্থাৎ ‘চোক’ সকল মুখাইয়া উঠে **বিমুকুল** এবং ক্রমে শাখার আকার ধারণ করে। এক্ষণে শাখা প্রশাখার শেবাগ্রভাগস্থ ২৩টি মাত্র উদ্ভাসিত চোক বা নবোদগত শাখা রাখিয়া অপরায় গুলিকে ভাঙ্গিয়া দিতে হয়, কারণ তাহা হইলে অবশিষ্ট শাখাগণ সমূহ তেজাল ও মৃপুষ্ট হইতে পায় এবং তজ্জাত পুষ্পগণও পূর্ণায়তন ও উজ্জ্বল বর্ণের হইয়া থাকে। এই প্রথাকে ইংরাজিতে *disbudding* কহে।

ছাঁটিয়া দিবার পর ৫৬ সপ্তাহ মধ্যে গাছে পুষ্প-মুকুল দেখা দেয়। এত শীঘ্র পুষ্প মুকুল দেখা দিলে বৃক্ষগণ **কুঁড়ি-হরণ** অধিক বর্দ্ধিত হইতে সময় পায় না, বর্দ্ধিত হইবার শক্তিও অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এইজন্য প্রথমাবস্থায় কুঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিলে নবোদগত শাখাগণ সমধিক বর্দ্ধিত হইতে পায় এবং তাহা হইতে আরও কোঁকড়ি জন্মিতে পারে। গোলাপের শাখাদির গাত্রে ফুল হয় না,—শাখাদির শিরোভাগে ফুল হইয়া থাকে, সুতরাং শাখা-প্রশাখা অধিক হইলে বৃক্ষগণের পুষ্প ধারণ করিবার স্থান অধিক হয়। এক দফা কুঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিবার পর পুনরায় যে সকল কুঁড়ি দেখা দিলে তাহাদিগকে আর ভাঙ্গিতে হয় না, তবে ফুল উৎপন্ন করিতে হইলে প্রত্যেক

উগার প্রথম কুঁড়ীকে রাখিয়া অবশিষ্টকে ভাঙ্গিয়া, ফেগা উচিৎ। প্রশ্ননৌতে পুষ্প প্রেরণ করিতে হইলে উক্ত প্রশালী অলম্বনীয়। গাছের নবোদগত শাখাগণ যদি বেশ তেজাল ও দীর্ঘ হইয়া বাহির হয়, তাহা হইলে প্রথম কুঁড়িদিককে ভাঙ্গিয়া দিবার আবশ্যক নাই।

কুঁড়ি দেখা দিবার প্রাক্কালে গাছের গোড়ায় একবার তরল সার দিলে ফুল বড় হয়, ফুলের গুচ্ছগা বৃদ্ধি তরল-সার হয়। ডগার পত্র ছোট হইয়া আসিলে বুঝিতে হইবে যে কুঁড়ি দেখা দিবার সময় আগতপ্রায় এবং তৎক্ষণিই জলীয়-সার দিবার প্রকৃত সময়। তরল-সার দেওয়া হউক বা না হউক, এ সময়ে গাছের যেন কোন মতে জলাভাব না হয়। এ সময়ে জলাভাব হইলে ফুল ভাল হয় না, অনেক কুঁড়ি প্রফুটিত হইতে না পাইয়া শুকাইয়া যায়, তাহা বাতীত প্রফুটিত ফুল ও শীঘ্র ঝরিয়া পড়ে। গোড়ার মাটি রমাল থাকিলে ফুল অধিক দিন বৃক্ষে স্থায়ী হয়।

গোলাপ গাছ হইতে পুষ্প আহরণ করিবার একটা নিয়ম আছে। সচরাচর লোকে বৌটা ভাঙ্গিয়া পুষ্প চয়ন প্রশালী চয়ন করিয়া থাকে। যে সকল ডগায় একাধিক ফুল হয়, তাহা হইতে উল্লিখিত প্রশালীতে পুষ্প চয়ন করা ভিন্ন উপায় নাই, কিন্তু যে ডগায় একটা মাত্র ফুল থাকে, তাহাকে চয়ন করিতে হইলে পুষ্প সমেত ডগায় এক বিতস্তি তাম্র ছুরী বা কাচি দ্বারা কাটিয়া লইলে কণ্ঠিত স্থানের নিম্নে নূতন শাখা উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে আবার ফুল হয়। এক বা একাধিক ফুল

হউক, প্রত্যেক ডগার ফুল শেষ হইয়া গেলে তাহার শিরোভাগের এক বিতস্তি আন্দাজ কাটিয়া দিলে আবার ফুল চইয়া থাকে। প্রস্পিত ডগাকে একরূপে কাটিয়া না দিলে ডগার শেষাগ্রভাগ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফেঁকড়ি বাহির হইয়া গাছকে কদম্বী করিয়া ফেলে এবং শিরোদেশ ভারি হইয়া হেলিয়া পড়ে।

## অষ্টম অধ্যায়

—:—

কোন উদ্ভিদকে ইচ্ছামত আকারে পরিণত করিবার পদ্ধ-  
 তিকে নিয়ন্ত্রিত কহে। সকল গাছকেই যে  
 নিয়ন্ত্রিত নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়, তাহা নহে। যে সকল  
 দ্রুপ বা লতা স্বভাবতঃ বিক্ষিপ্তভাবে বর্দ্ধিত হয়, তাহাদিগকে  
 আয়ত্ন মধ্যে রাখিবার কিম্বা অভিলষিত কোন আকারে পরিণত  
 করিবার নিমিত্ত নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। উক্ত প্রণালীকে  
 ট্রেনিং‌তে training কহে। নিয়ন্ত্রিত গোলাপ বৃক্ষ দেখিতে  
 সুন্দর হইয়া থাকে। এই প্রণালীতে গোলাপ বৃক্ষকে জাক্রি,  
 প্রাচীর, স্তম্ভ প্রভৃতি আকারে নিয়ন্ত্রিত করিবার মূল উদ্দেশ্য—  
 উহাদিগের শ্রী বৃদ্ধি করতঃ উদ্ভানের শোভা বর্দ্ধিত করা।  
 স্বভাবতঃই গোলাপ বিশৃঙ্খল উদ্ভিদ, এবং সামান্য সুবিধ পাইলে  
 নানা স্থান হইতে শাখা বিস্তার করে, সুতরাং উহাদিগের উপর  
 সর্বদা লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্তব্য।

দেয়ালে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে বুদ্ধিশীল লতিকাজাতির  
 গোলাপ নির্বাচন করতঃ দেয়ালের অতি সন্নিকটে  
 প্রাচীরাবরণে রোপণ করিতে হইবে। নয়সেট,—লতানিয়া ‘টা’  
 জাতির গোলাপবৎ লতাস্বভাব, সুতরাং এতদ্বন্দ্বেষ্টে তাহাদিগের  
 ভিতর হহতে গাছ নির্বাচন করা উচিত। এতদ্ব্যতীত রোজা-  
 জাইগ্যান্টিয়া (Rosa gigantia) গোলাপও রোপণ করা যাইতে  
 পারে। নয়সেট জাতীয় গোলাপ অপেক্ষা ইহা স্বরিত বুদ্ধিশীল এবং  
 ইহার শাখা-প্রশাখা সমধিক সুদীর্ঘ হইয়া থাকে। ইচ্ছামত উক্ত  
 জয়বর্ষী গাছের স্থানে স্থানে বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের গোলাপের  
 ‘চোক’ বসাইয়া দিলে সেই সকল ‘চোক’ হইতে যে শাখা  
 প্রশাখা জন্মে, তাহাতে যে যে জাতির গোলাপের চোক বসান  
 হয়, তাহারই মত ফুল হইয়া থাকে। সুতরাং নানা জাতিয়  
 ‘চোক’ বসাইলে একই গাছে নানা জাতির পুষ্প উৎপন্ন  
 হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, গাছ রোপণ করিবার  
 পর যথারীতি পালন করিতে থাকিলে উহা হইতে যে  
 ফেঁকড়ি জন্মে তাহাদিগের মধ্যে সুপুষ্ট ও তেজাল ২৩ টা  
 ছড়িকে ধীরতা সহকারে দেয়ালের সহিত সংলগ্ন করিয়া দিবে।  
 উক্ত ছড়ি হইতে যত শাখা-প্রশাখা উদ্গত হইতে থাকে,  
 ( ১ নং চিত্র ) তাহাদিগের মধ্যে তেজাল শাখাগুলিকে  
 ছেলাইয়া পূর্ববৎ দেয়ালে সংলগ্ন করিয়া দিতে হইবে। অপরাপর  
 নিম্নোক্ত ও শীর্ণ ফেঁকড়ি সমূহকে একবারেই বিনাশ করিতে  
 হইবে। গাছ কত বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, ততই তাহাদিগকে  
 উল্লিখিত প্রণালীতে উর্দ্ধে ও পার্শ্বদেশে প্রসারিত করিয়া দিতে  
 হইবে। এইরূপে অনেক অপ্রীতীকর প্রাচীর বা দেয়াল আবৃত

করিয়া স্থানীয় সৌন্দর্য্য স্থায়ীভাবে বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়।  
ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গোলাপ রোপণ করা অপেক্ষা জয়বন্তী গোলাপ  
রোপণ করতঃ তাহারই অঙ্গের স্থানে স্থানে 'চোক' বসাইয়া  
দেওয়া অধিক ফলপ্রসূ, কারণ জয়বন্তী নিজেই অতি বৃদ্ধিশীল এবং  
বারমাসই পত্র ধারণ করিয়া রথে, এজন্ত উহার ছড়ি সমূহ  
বন পত্র বিস্তারিত আবৃত হইয়া থাকে।

কোন খুঁটি বা স্তম্ভকে অবলম্বন করিয়া যে গাছ উর্দ্ধগামী  
হয়, তাহাকে স্তম্ভাকার (Pillar-Shaped)  
স্তম্ভাকার গাছ কহে। ৪৫ হাত উচ্চ খুঁটি বা স্তম্ভ হইলে  
তাহাতে বৃদ্ধিশীল হাইব্রিড-পার্পেচুয়াল, বোরসন্ট প্রভৃতি গাছ  
রোপণ করিলেই চলে কিন্তু অবলম্বন সুদীর্ঘ হইলে নয়সেট বা  
জয়বন্তী গোলাপই প্রশস্ত। স্তম্ভাকারের গাছ তৈয়ার করিবার  
জন্য নিম্নলিখিত প্রণালী মধ্যে বিশেষত্ব কিছু নাই, তবে গাছের  
শাখা-প্রশাখা দ্বারা খুঁটি বা স্তম্ভটি বাহাতে উত্তমরূপে আবৃত  
পাকে (২ নং চিত্র) এবং বাহাতে নানাদিক হইতে শাখা-প্রশাখা  
জনিয়া উহার আকার বিকৃত করিয়া না দেয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য  
রাখা উচিত। ঘড় বাড়ীর দর-দালান বা বারান্দা নিরন্তরিত  
করিতে পারিলে বড় বাহার হয়। ঈদৃশ স্থলে প্রত্যেক ধামের  
পাদদেশে একটা করিয়া লতানিয়া গোলাপ—এক জাতীয় হউক  
বা বিভিন্ন জাতীয় হউক—রোপণ করতঃ পূর্বোক্ত নিয়মে  
তাহাদিগকে নিরন্তরিত করিতে হয়। এস্থলে কেবল দেখিতে হইবে  
যে ধামের পার্শ্বস্থিত খিলানযেন উহাদিগের শাখা প্রশাখায়  
বদ্ধ না হয়। প্রত্যেক ছড়িকে সুকৃতি সহকারে নিরন্তরিত  
করিতে পারিলে এবং প্রত্যেক শাখা-প্রশাখাকে স্বতন্ত্র ভাবে

কোন চিত্রবৎ করিতে পারিলে জীবন্ত ছবি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ছত্রাকারের গাছ (Umbrella) তৈয়ার করিবার জন্ত প্রথমতঃ

একটা রোজ-এডওয়ার্ড (Rose Edward) বা

ছত্রাকার

জন্মধৰ্মীর এক-কাণ্ড (Single stemmed) গাছ

তৈয়ার করিতে হইবে। এজন্ত একটা গাছকে যথাস্থানে রোপণ করিয়া তাহাতে একটা মাত্র সরল কাণ্ড রাখিতে হইবে। সরল কাণ্ডটা চারি হাত উচ্চ হইয়া উঠিলে শিরোভাগের এক হাত নিম্নে অনতিদীর্ঘ-শাখী হাইব্রিড-পার্পেচুয়াল, মস, বোরবো বা টী-জাতির তিন চারিটা চোক (bud) বসাইয়া দিতে হয়। চোক কয়টাকে কাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন দিকে স্থাপন করা আবশ্যিক। একাংশে চোক বসাইলে ভবিষ্যতে গাছ এক পার্শ্বের ভরে পড়িয়া যায়। সেই সকল চোক হইতে যথা সময়ে শাখা বহির্গত হইয়া ছত্রাকার ধারণ করে। দীর্ঘ ও কোমল-শাখী গাছের চোক সংযুক্ত করিলে তৎপন্ন শাখা সমূহ ঝুলিয়া পড়ে ফলতঃ কাণ্ড ঢাকিয়া গিয়া অবনামিত (weeping) বা শুস্তাকার গাছের অনুরূপ হইয়া পড়ে। কাণ্ডে চোক সংলগ্ন হইয়া গেলে সর্বোচ্চ গ্রাছুর উপরভাগস্থিত কাণ্ডাংশ একেবারে ছেদন করিয়া দিতে হইবে। নিম্নভাগস্থিত কাণ্ডের গাত্রে আর শাখা না জন্মে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ছত্রাকার গাছ ছাঁটিবার নিয়ম এই যে, উহার আকার বজায় রাখিয়া অঙ্গচালনা করিতে হয়। গাছের শিরোভাগ ভারি হইয়া পড়িলে গোড়ার একটা অনতিস্থূল খুঁটি পুতিয়া তাহার সহিত গাছকে বাধিয়া রাখা উচিত। ছত্রাকার গাছকে দাঁড়া (Standard) গাছ বলিতে পারা যায়। (৩ নং চিত্র দেখুন)।



গম্বুজাকার (Dome-shaped) গাছ ছোট জাতীয় গোলাপে ভাল হয়। লতানিয়া বা দীর্ঘ দণ্ড গাছ একবারেই গম্বুজাকার পরিহার্য। গাছকে গম্বুজের আয় আকারে ছাঁটিলে সহজেই উহা গম্বুজের আয় আকার ধারণ করে। এতদ্ব্যতীত গাছের বহির্দেশস্থ শাখা সমূহকে বড় রাখিয়া তদুপরিস্থিত শাখাদিগকে ক্রম অনুসারে ছোট করিয়া ছাঁটিতে হয়, এবং তাহা হইলেই গম্বুজাকার গাছ হইল। (৪ নং চিত্র দেখুন)।

যে গাছকে কৃত্রিম উপায়ে অবনত আকারে পরিণত করা যায়, তাহাকে অবনামিত (weeping) বৃক্ষ অবনামিত কহে। এতদ্ব্যতীত লতিকা স্বভাব গাছই আবশ্যক। নির্দোষিত গাছকে প্রথমতঃ উর্দ্ধদিকে দীর্ঘ করিবার চেষ্টা করিতে হয়। একত্রে উহার তিন বা চারিটা তেজাল সরল ও উর্দ্ধগামী শাখাকে একটা স্থায়ী খুঁটির সাহায্যে উর্দ্ধদিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। খুঁটি ছয় হইতে আট বা নয় হাতের অধিক উচ্চ হওয়া উচিত নহে। খুঁটি অধিক উচ্চ হইলে বৃহৎ সিঁড়ি বা মই না হইলে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে অস্ববিধা হয়। এতদ্ব্যতীত আসল গাছ অপেক্ষা জয়ঘণ্টা গাছ রোপণ করতঃ উল্লিখিত প্রণালীতে বর্দ্ধিত করিয়া, তাহার শিরোভাগে নয়সেট জাতীয় গোলাপের চোক সংযোজিত করিলে ভাল হয়। পূর্বেই বলিয়াছি যে জয়ঘণ্টা গাছ অতিশয় দীর্ঘ-শাখী ও তেজাল হইয়া থাকে, ফলতঃ তজ্জাত চোক হইতে যে সকল শাখা-প্রশাখা উৎপন্ন হয়, তাহারাও সমধিক তেজাল ও দীর্ঘ শাখী হয়। অবনামিত গাছের ছড়ি সমূহ যত দীর্ঘ হয় তত তাহার মনহারিত্ব

বৃদ্ধি পায়। কেবল জয়ঘণ্টা গাছেও সুন্দর অবনামিত গাছ হইয়া থাকে। জয়ঘণ্টা গাছ অবনামিত হইলে একটা দোষ ঘটে যে, তাহাতে কেবল চৈত্র বৈশাখ মাসেই ফুল সনাগত হয় কিন্তু জয়ঘণ্টার মূলদণ্ডে নয়সেট গাছের শাখা-প্রশাখা হইলে

৫ নং চিত্র



গাছ তেজাল ও দীর্ঘ হয়। এবং বৎসরের অনেক সময়ই তাহাতে পুষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। শিরোভাগে চোক বসাইতে হইলে অপেক্ষাকৃত কাল বিলম্ব হয়। এট জগ্ন তাহা না করিয়াও সামান্য প্রণালীতে জয়ঘণ্টাতে জোড় বন্ধ গাছ হইলে চলিতে পারে। জয়ঘণ্টাকে উচ্চে বদ্ধিত করিয়া চোক

বসাইতে হইলে চত্বাকার প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, নতুবা জোড়-কলমের কলমাংশের তেজাল ও গুণী ডালকে সরল ভাবে টুর্কে বদ্ধিত করিয়া পরে তাহাদিগকে ঝুলিয়া পড়িতে দিতে হইবে। অবনামিত করিবার জন্ত গাছের গোড়ায় একটা ফুল ও সুগোল কাঠ দণ্ড পুতিয়া দিয়া তাহাতেই গাছকে বাধিয়া ক্রমশঃ নিঃস্থিত করিতে হয়। বলা বাহুল্য যে, খুঁটি ঘেন গাছ দ্বারা আবৃত থাক এবং গাছের কাণ্ডে আদৌ শাখা-প্রশাখা বর্হগত না হয়। নিয়ন্ত্রিত গাছ জয়ঘণ্টা হইলে তাহাকে কাটির আনয়ক হয় না, কেবল তাহার কাঠামকে ঠিক রাখিবার জন্ত আস্থানিক শিক্ড়িগুলিকে কাটিয়া দিতে হয়। নয়সেট হইলে তাহাদিগের জাতিগত ছাঁট অল্পসারে কাটিয়া দিতে হইবে। ( ৫ নং চিত্র দেখুন )।

নিম্নতর প্রণালী দ্বারা একই গাছকে দুই তিন চারি বা ততোধিক দিকে প্রসারিত করিতে পারা নিতরুণকার দ্বারা। 'নিতরুণকার' বস্তু লতানিয়া গোলাপ,— নরসর্প বা জরসর্প কিবা দীর্ঘ-শাখা নির্মাচন করা উচিত। অনন্তর গাছকে রোপন করিয়া পালন করিতে হয়। পরে যে করদিকে প্রসারিত করিতে হইবে তাহা তির করিয়া মূল্যংশে সেই করটী মাত্র চোক রাখিয়া গাছের অবশিষ্টাংশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে। এক্ষণে গোড়া হইতে নুতন শাখা উৎপন্ন হইতে থাকিবে। শাখাগুলিকে আপাততঃ অবধি বর্জিত হইতে দিতে হইবে। ইচ্ছা স্থগিত হইলে, যে যে দিকের শাখা, তাহাকে সেই দিকে হেলাইয়া এক একটী খুঁটীর সহিত বাধিয়া দিতে হয়। খুঁটীগুলি ভূমি হইতে ৪৫ হাত উচ্চ এবং দুই ইঞ্চি চওড়া ও দুই ইঞ্চি পুরু অর্থাৎ চারি বর্গ ইঞ্চি হইলেই চলিতে পারে। গাছের গোড়া হইতে সমান্তরালে

৬ নং চিত্র



খুঁটিগুলিকে পুতিতে হয় এবং তাহাতেই হেলান শাখাদিগকে ভূম্যাভিমুখে টানিয়া বাধিয়া দিতে হইবে। এক্ষণ হইতে শাখাগণ শান্তিভাবে পার্শ্বদিকে বর্জিত হইতে থাকিবে এবং শাখাস্থিত গার তাবৎ পত্র সুক্লম হইতে—বিশেষতঃ সর্বাধিক বক্র tension স্থান হইতে—ফেঁকুড়ি উদগত হইতে থাকিবে। এই সকল

ফেঁকড়িকে আদৌ না থাকিতে দিয়া কেবল শায়িত শার্খা কয়টিকে বন্ধিত করিতে হইবে। শায়িত শাখাগণ আবদ্ধ স্থান হইতে ২।৩ হাত দীর্ঘ হইলে ধীরতা সহকারে তাহাদিগের অবশিষ্টাংশকে খুঁটিতে সরলভাবে বাঁধিয়া উর্দ্ধদিকে পরিচালিত করিতে হইবে। এইরূপে একই গাছে যে কয়টা খুঁটি থাকিবে,—উত্তানাস্থানীয় ইচ্ছানুসারে,—ততগুলি অবনামিত বা ছত্রাকার বা স্তম্ভাকার দৃশ্য নির্মাণ করা যাইতে পারে।—অবলম্বনের জন্ত যে সকল খুঁটি ব্যবহৃত হইবে, তৎসমুদায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন। কোমল কাঠের খুঁটি সহজেই উই পোকায় নষ্ট হয় কিম্বা গচিয়া যায় অথবা গাছের ভরে পড়িয়া বা ভাঙ্গিয়া যায়। একরূপ ব্যাবাহত খুঁটিতে নিয়ন্ত্রিত গাছের শাখা-প্রশাখা কেবল যে ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা তাহা নহে, নূতন অবলম্বন পুনঃ সংস্থাপন কালে অনেক শাখা-প্রশাখা স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়ে এবং তাহাতে আপাততঃ কিছুদিনের জন্ত বৃক্ষের ক্রী নষ্ট হয়। এই জন্ত কঠিন কাঠের খুঁটি দুই কিম্বা দুই ইঞ্চি স্থল লৌহের নল (Pipe) ব্যবহার করিলে ভাল হয়। যে কোন জিনিষ ব্যবহৃত হউক, তাহাকে এক বা দুই প্রহ রং দ্বারা বঞ্জিত করিয়া দিলে খুঁটি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

নির্দিষ্ট স্থান ব্যবস্থানে এক একটা খুঁটি প্রোথিত করতঃ

প্রত্যেক খুঁটির গোড়ায় একটা লতানিয়া গোলাপ

সাল্যাকার

রোপণ করিতে হইবে এবং সেই সকল গাছকে

নিয়ন্ত্রিত করিয়া খুঁটির উর্দ্ধসীমা পর্য্যন্ত আনিয়া ডগা সমূহকে

পার্শ্ব দিয়া অপর খুঁটির দিকে লইয়া যাইতে হইবে। খুঁটির

মস্তকে মস্তকে বাঁশ শায়িত করিয়া দিলে লতিকা সমূহ তদবলম্বনে

ବିଭିନ୍ନ ଋଷ୍ଟିରେ ପ୍ରସାରିତ ହିତେ ପାରେ । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥାଳୀକେ ଯାଲ୍ୟ  
କରଣ (cordoning) କହେ । ଏତଦ୍ଦେଶେ 'ଜୟଷଟୀ' (Rosa  
gigantia) ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ । ( ୧ ନଂ ଚିତ୍ର ଦେଖନ ) ।

ସେ ସକଳଗୋଲାପ ଗାଛକେ ଏକଟି ଯାତ୍ରା ଦଣ୍ଡେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରା ଯାଏ

ତାହାକେ ଏକ-ଦଣ୍ଡ ବା ଟାଢ଼ା ଗାଛ ବଳିତେ ପାରା  
ଟାଢ଼ା ଗାଛ ଯାଏ । ଇଂରାଜିତେ ଇହାକେ Standard କହେ ।

ଚାରା ଗାଛର ଏକଟି ଯାତ୍ରା ସରଳ ଓ ତେଜାଳ ଦଣ୍ଡକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିକେ  
ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପରେ ତାହାର ଶିରଫେଦନ କରତଃ ତାହାର ଗାତ୍ରେ  
ଚୋକ-କଲମ କରିତେ ହସ୍ତ । ଚାରା ଗାଛ ଜାତୀୟ ଗୋଲାପେର ଚୋକ  
ବମାହିଲେ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଟାଢ଼ା-ଗାଛ ହିସାବରେ । ଟା-ଗୋଲାପ  
ବହୁ ଶାଖୀ ଓ ସ୍ୱାବଳମ୍ବୀ । ଏତନ୍ନିବନ୍ଧନ ଚାରା ଗାଛ କାଣ୍ଡେର ଶିରୋଭାଗ  
ହିତେ ଯୁକ୍ତଲିତ ହିସା ଚାରିଦିକେ ଶାଖା-ପ୍ରଶାଖା ବିସ୍ତାର କରେ ଏବଂ  
ଦେଖିତେ ଯନୋହର ହସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ହାହିବ୍ରିଡ ପାର୍ପେଟୁରାଲ ପ୍ରଭୃତି ଦୀର୍ଘ,  
ଓ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଗାଛର ଚୋକ ରୋପଣ କରିଲେ ତତ୍ତ୍ୱପନ୍ନ ଶାଖା-ପ୍ରଶାଖା  
ଦୀର୍ଘକାର ଧାରଣ କରିବା ଅବଶ୍ୟେ ପାର୍ଶ୍ୱଭାଗେ ଖୁଙ୍କିବା ପଡ଼େ ଓ  
ବିକୃତକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହସ୍ତ, ଅପରନ୍ତ ମୂଳ କାଣ୍ଡକେ ଓ ଡାକିବା କେଳିତେ  
ପାରେ । ଦୀର୍ଘ ଶାଖୀ ଲତିକା ସ୍ୱଭାବ ନୟନେଟ ଜାତିର ଚୋକ  
ରୋପିତ ହିସା ଯୁଦୀର୍ଘ ଶାଖା-ପ୍ରସାରିତ ହିସା ମୂଳକାଣ୍ଡକେ ଡାକିବା  
କେଳେ ଯୁତ୍ରାଂ ଟାଢ଼ା ଗାଛର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହିସା । ଏବଂ  
ଟାଢ଼ା ଗାଛ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ବାର୍ଥ ହସ୍ତ । ଟା ଜାତିର ଚୋକ  
ରୋପଣ କରିଲେ ଉଲ୍ଲିଖିତ କୌଣସି ଶାଖା ଧାକେ ନା ଅଧିକତଃ  
ଟା ଜାତୀୟ ଗାଛର ସ୍ୱାଭାବିକ କୋମଳତା, ପତ୍ତେର ଚିକନତା ସ୍ୱାମିତ୍ୱ  
ପ୍ରଭୃତି ଯେକୌଣସି ଆଦର୍ଶର ବସ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବାର  
ଶକ୍ତି ଥାକାର ଯାତ୍ରା ଓ ସ୍ୱହନାୟ । ଚାରା କାଣ୍ଡେ ଟା ଜାତୀୟ ଚୋକ

রোপণ করিলে তত্ক্ষাত শাখা-প্রশাখা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিতে পারে সুতরাং কাণ্ডটী সুস্পষ্ট ভাবে লোকের দৃষ্টি মধ্যে]

৭ নং চিত্র



থাকে। যাহা হউক চারা-কাণ্ডের উচ্চতানুসারে দুই প্রকারের দাঁড়া-গাছ হইয়া থাকে। উক্ত দুই প্রকারের মধ্যে—

( ১ ) বামন-দাঁড়া (Dwarf Standard) করিবার জন্য মূল-

৮ নং চিত্র



কাণ্ডকে এক ফুট হইতে তিন ফুট উচ্চ করিতে পারা যায়। পধি পার্শ্বস্থ খরজা অতিক্রম করিয়া সমশ্রেণীতে চারি হস্ত ব্যবধানে এক একটা গাছ রোপণ করিলে স্থানীয় শোভা পরিবর্দ্ধিত হয়। অন্তঃপর—

( ২ ) উচ্চ-দাঁড়া (Full or Long Standard) ভৈরার করিতে হইলে মূল কাণ্ডকে দুই হইতে তিন ফুট উচ্চ করিতে পারা যায়। ইহাদিগের জন্য তৃণমণ্ডলোপরি স্থানে স্থানে কেয়ারি রচনা করিয়া গাছ রোপণ করা উচিত। ইহাদিগকে বিশেষত্ব দিবার জন্য তৎসন্নিহিত স্থানের কিছু দূর ব্যাপিয়া এরূপ

কোন গাছ রাখা উচিত নহে, বন্ধারা প্রথমোক্তদিগের আশাত  
৯ নং চিত্র



কিঞ্চিদ্ভাও নষ্ট হইতে পারে।  
তৃণমণ্ডলোপরি রোপিত বলিয়া যে  
গাছের গোড়া তৃণাবৃত থাকে উচিত,  
তাহা নহে। তৃণদল মূল সংস্পর্শিত  
হইয়া থাকিলে গাছের বৃদ্ধি, শক্তি, পত্র  
বাহন্য প্রভৃতির ক্ষতি করে। একত্ন  
প্রত্যেক গাছের গোড়ায় দুই হাত  
হইতে চারি হাত স্থান থাকা একান্ত

প্রয়োজন। গাছের গোড়ায় এতাদিক স্থান তৃণহীন অবস্থায়  
থাকিলে তৃণমণ্ডলের শোভার কথঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটে, কিন্তু  
তাহার নিবারণ করে ঋতু বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র জাতীয় ঋতু-  
বাহার (Season flower) রোপণ করিলে তৃণহীনতা দোষ  
বিদূরিত হয়, উপরন্তু স্থানীয় শোভাও বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়।  
মণ্ডিত স্থানকে লাল ও হরিৎ জোলাই (amaranthus), কিম্বা  
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রঞ্জিত প্রস্তর খণ্ড দ্বারা কারুকার্য্য সহকারে সজ্জিত  
করিয়া রাখিলেও চলিতে পারে।\*

চারি গাছের কাণ্ডে চোক রোপণ না করিয়া দাবা-কলম  
বা শাখা-কলম সঙ্গ মত উচ্চ করিয়া পরে তাহার শির-  
চ্ছেদন করিয়া দিলে চলিতে পারে। অতঃপর ছেদিত কাণ্ডে  
শাখা-প্রশাখা বাহির হইতে থাকে। কাণ্ডের উপরিভাগের  
৩৪টা মাঝ চোক রাখিয়া অপর গুলিকে একবারে পেথিত করিয়া

---

\* সংস্কৃত 'মালক' নামক পুস্তকের দ্বাদশ অধ্যায়ে 'উদ্ভিদিক আশন'  
রচক করিবার প্রক্রিয়া লিখিত হইয়াছে।

দিতে হয়। যে ৩৪টী চোক রক্ষিত হইবে, ততদগত ডাঁল-পালা  
তবিস্বতে বনোভূত না হয়, এজন্ত প্রতি তিনটী চোকের মধ্যস্থিত  
চোককে নষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। জোড় কলম, চোক-কলম  
প্রভৃতি কৃত্রিম অপেক্ষা স্বমূল উদ্ভিদ তেজাল ও বহু-পুষ্পক হয়।

দাঁড়া-গাছের মূল দণ্ড যতদিন না স্থূল ও কঠিন হইয়া উপরি-  
ভাগকে সহজে বহন করিতে পারে, ততদিন পর্যন্ত অবলম্বনের  
জন্ত তাহার সংলগ্নে একটী খুঁটি থাকা আবশ্যক এবং শিরোদেশের  
ভারে গাছ ধরাশায়ী হইয়া না পড়ে, এজন্ত শাখা-প্রশাখার সংখ্যা  
হ্রাস করিয়া নিজ আয়ত্ব মধ্যে রাখিতে হয়, পরে আপন ভার  
আপনি বহন করিতে সমর্থ হইলে অবলম্বনকে অপসারিত করিলে  
ক্ষতি নাই।

পুষ্পের শোভা ও সৌন্দর্য্য, আকার ও গঠন, সৌরভ ও  
লাবণ্য, সকলেরই] নিকট প্রিয়, কিন্তু গাছেরও  
গাছের শোভা  
যে নিজস্ব একটী শোভা আছে এবং গাছকেও  
যে ইচ্ছানুরূপ আকারে নিয়ন্ত্রিত করিলে তাহার শোভা বর্দ্ধিত  
করিতে পারা যায়, তাহা হয়ত অনেকের মনেই আসে না,  
এই জন্ত আমরা উদ্ভান মধ্যে সৌন্দর্য্যশালী গোলাপ গাছ  
দেখিতে পাই না। ফুলের সময় গাছের শোভা বর্দ্ধিত হইয়া  
থাকে, ইহাতে নুতনত্ব কিছুই নাই। বৃক্ষগত শোভার দিকে  
দৃষ্টি না থাকিলে পুষ্পাধিত বৃক্ষের শোভাও সম্পূর্ণ দেখা যায় না।  
আমরা পুষ্পেই সম্বলিত, সুতরাং পুষ্প উৎপন্ন করিতে পারিলে যেন  
আমাদিগের আশায় শেষ হইল, কিন্তু তাহা নহে। নয়নরঞ্জক  
গাছ উৎপন্ন করিতে পারিলে বারমাসই তাহা নয়নানন্দদয়ক হইয়া  
থাকে। অতঃপর যখন পুষ্প দ্বারা সুশোভিত হয় তখন উহার



কত না শোভা পরিবর্দ্ধিত হয় ! যে বাগানেই বাই, সেখানেই দেখিতে পাই যে গোলাপের কাণ্ড নাই, সকল গাছই গোড়া হইতে দুই চারি বা ততোধিক শাখা প্রসারিত করিয়া রহিয়াছে। ইহাতে মনে হয় যেন, উদ্ভানস্বামীগণ ধারণা করিতেই পারেন না যে, গোলাপ গাছ কাণ্ডজ অর্থাৎ এক-কাণ্ড উদ্ভিদ হইতে পারে কিম্বা গোলাপ গাছকে নানাবিধ আকারে পরিণত করিতে পারা যায়। সচরাচর আমরা গোলাপের চারা উৎপন্ন করিবার জন্ত দুইটি উপায় অবলম্বন করিয়া থাকি,—দাঁবা-কলম ও জোড়-কলম। ইহার স্বাভাবিক ফল এই যে, সেই সকল রোপিত কলমের গোড়া হইতেই একাধিক শাখা উদ্গত হয় এবং সকল গাছই একই আকারের হইয়া থাকে। যাহা হউক উদ্ভান মধ্যে প্রাচীন স্থলে নূতনের যাবস্থা করিতে হইবে—নানা আকারের গোলাপ গাছ তৈয়ার করিতে হইবে। এস্থলে সংক্ষেপে কয়েকটি মাত্র আকারের উল্লেখ করিব। অতঃপর পাঠক নিজেই স্বীয় সঙ্কল্পানুসারে গাছ উৎপন্ন করিয়া উদ্ভানের শোভাবর্দ্ধন করিয়া নিজ নিজ চিত্ত বিনোদন করিতে পারিবেন। নিয়ন্ত্রন প্রক্রিয়ানুসারে কোন বৃক্ষকে তৈয়ার করিতে হইলে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। নিয়ন্ত্রিত বৃক্ষে পুষ্পের সমাগম হইলে বড়ই মনোহর হইয়া থাকে। কোন প্রকার দাঁড়া গাছই অতি বিস্তৃত বা অধিক বৃদ্ধিশীল হয় না, সুতরাং তাহাদিগকে আরও মুখো রাখা সহজ। প্রাচীরাবরণ ভিন্ন অপর সকল প্রকারের নিয়ন্ত্রিত গোলাপকে তৃণমণ্ডলোপরি দূরে রক্ষা করিলে তৃণমণ্ডল ও উদ্ভিদ,—উভয়ের মৌল্য বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

দাঁড়া-গাছের জন্ত হাইব্রিড পার্পেচুয়াল গাছের চোক বিশেষ ফলপ্রসূ। লম্বা-দাঁড়াতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ-শাখী বা বাড়ন্ত গাছের, এবং বামন-দাঁড়াতে মধ্যমাকার গাছের চোক বসানি উচিত। ইহাদিগকে ছাঁটিবার সময় প্রত্যেক গাছের আকার সাহায্যে বজায় থাকে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দাঁড়া গাছের মূল কাণ্ড হইতে সময়ে সময়ে যে ফেঁকড়ি বাহির হয় তাহাদিগকে গোড়া ঘেসিয়া কাটিয়া দেওয়া আবশ্যক।

স্বমূল-সম্ভূত শাখা-কলম ও দাবা-কলমকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায়, কিন্তু উদ্দেশ্য বিশেষের জন্ত জাতি বিশেষ গাছ নির্বাচন করিতে হয়।

## নবম অধ্যায়

আজকাল অনেক রকমের কলম করিবার প্রণালী উদ্ভূত হইয়াছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই প্রাচীন কলমের প্রকার কয়েটির অল্পাধিক সংস্কার মাত্র। কলম করিবার প্রধানতঃ দুইটি প্রণালী আছে,—১ম, গাছের কোন অংশ মাত্র লইয়া ;—২য়, চারা বা শাখা কলমের সহিত অপূর্ণ গাছের কোন অংশের সংযোজন দ্বারা। প্রথম প্রণালীর অন্তর্গত,—শাখা বা ডাল-কলম (cutting), গুল বা গুলি-কলম, এবং দাবা-কলম (Layer)। দ্বিতীয় প্রণালীর অন্তর্গত,—চোক কলম(budding), জিহ্বা বা জিহ্বা-কলম (Tongue graft) ও জোড়-কলম (Inarch)। এতদ্ব্যতীত, কৃত্রিম উপায়ে কলম


উৎপন্ন করিবার আরও কয়েকটা প্রক্রিয়া আছে, কিন্তু গোলাপের কলম করিবার জন্য সে সকলের আবশ্যক হয় না, এজন্য এস্থলে তাহাদিগের উল্লেখ করা গেল না।

গাছের শাখাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কৰ্ত্তন করতঃ যে কলম

থঙ-শাখা হয় তাহাকে খণ্ড-শাখা বা শাখা-কলম বা ডাল-কলম বলা যায়।

অনতিদূর ও অর্ধ পরিপক্ব শাখাতে উৎকৃষ্ট শাখা-কলম হইয়া থাকে। অতিশয় পরিপক্ব ও কঠিন শাখা অথবা অতি কচি ও কোমল শাখায় ডাল কলম হয় না, আর যে কিছু হয়, তাহাও তেমন তেজাল হয় না। পূর্ব বৎসরের শাখা নির্বাচন করিয়া তাহাকে এক বিত্তি পরিমাণ হিসাবে খণ্ড খণ্ড করিয়া কৰ্ত্তন করিলেই শাখা-কলম হইল। প্রত্যেক খণ্ডের পাদদেশের ও শিরোভাগের শেষ চোকের (leaf bud) বা গ্রন্থির বহির্ভাগে ঈষৎ হেলাইয়া কৰ্ত্তন করিতে হয়। ছড়ির গাত্রস্থিত শাখাকে ঈষৎ ছাল সমেত ভাঙ্গিয়া বা চাঁচিয়া তুলিয়া লইলে যে কলম হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত ভাল কলম হয় এবং সেরূপ কলমে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র শিকড় জন্মিয়া থাকে। (নিম্নস্থ চিত্র দেখুন)

১০ নং চিত্র



অতঃপর কলম তৈয়ার হইলে হাপোরে চারি অঙ্গুষ্ঠব্যবধানে প্রত্যেক কলমকে রোপণ করিয়া যথানিয়মে পালন করিতে হয়। ইহাপেক্ষা সহজ প্রণালী—কতকগুলি খণ্ডীকৃত কলমকে একত্রে গুচ্ছ বাঁধিয়া কোন ইষচ্ছায়া বিশিষ্ট স্থানে পুতিয়া রাখিতে হয়। গুচ্ছের তিন বা সার্ব্ব তিনাংশ মুক্তিকা মধ্যে পুতিয়া রাখা আবশ্যক। ১৫।২০ দিবস মধ্যে গুচ্ছস্থ সমুদয় কলমের গোড়ায় মূল বা মূলের অঙ্কুর (callus) বাহির হয়। এক্ষণে একবার প্রত্যুষে বা সায়াংকালে গুচ্ছকে তুলিয়া দেখিতে হইবে যে, গোড়ায় শিকড় বাহির হইয়াছে কি না। শিকড় বাহির হইয়া থাকিলে প্রত্যেক খণ্ড-কলমকে উল্লিখিত প্রণালীতে হাপোরে রোপণ করিতে হয়। যদি কেবল অঙ্কুরোদগম হইয়া থাকে, তাহাহইলে আরও দুই এক সপ্তাহ কালের জন্য উক্ত গুচ্ছকে পূর্ববৎ পুতিয়া রাখিতে হয় এবং শিকড় বাহির হইলে স্বতন্ত্রভাবে সকলকে রোপণ করিতে হইবে। এই প্রণালীতে বর্ষাকালে চারা উৎপন্ন করিতে হয়। সকল প্রকার গোলাপের শাখা-কলমে চারা উৎপন্ন হয় না। সাধারণতঃ বহু কলম তৈয়ার করিলে কয়েকটা মাত্র কলম পাওয়া যায়। জয়ঘণ্টা, সম্ভ্রুয়েল (Sombreuil), রোজ এডুয়ার্ড (Rose Eduoard) প্রভৃতি কয়েক জাতিব গোলাপ হইতে শাখা-কলম-প্রণালীতে অতি সহজেই চারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। জোড়-কলম, চোক-কলম, চোঙ-কলম প্রভৃতির জন্য শাখা-কলমের বিশেষ আবশ্যক হয়। এই জন্য প্রতি বর্ষাতেই উহাদিগের অল্লাধিক শাখা-কলম তৈয়ার করিয়া রাখা উচিত। আষাঢ় বা শ্রাবণ মাসে কলম করিলে আশ্বিন বা কার্তিক মাসে স্থানান্তরিত করিতে পারা যায়।

এক গাছের সহিত সেই জাতীয় অপর গাছের শাখা সংযো-  
 জিত করিয়া যে চারা উৎপন্ন হয় তাহাকে জোড়-  
 জোড়-কলম  
 কলম (Inarch) কহে। জোড়-কলম, চোক-  
 কলম, চোঙ্গ-কলম, জিব-(জিহ্বা) কলম প্রভৃতিতে দুইটা  
 স্বতন্ত্র গাছের সমন্বয় হয়। শাখা-কলম বা দাবা-কলমে তাহা  
 হয় না—ইহারা আপনাপন অবয়বের মৃত্তিকা সংযুক্ত স্থানে  
 শিকড় বাহির করে।—অনেক গাছ আপন মূলের উপর নির্ভর  
 করিয়া জীবিত থাকিতে পারে না কিবা নিজস্ব প্রাকৃতিক  
 সৌকুমার্য্য হেতু ভিন্ন দেশে বা ভিন্ন মৃত্তিকায় জীবন রক্ষণে  
 সমর্থ হয় না অথবা স্থানান্তর নিবন্ধন স্বীয় প্রকৃতি বিস্মৃত হইয়া  
 যায়, তন্নিবন্ধন তাহাদিগের আকার, বৃদ্ধি, ও ফলন-ফুলন  
 পরিবর্তিত হইয়া যায়। কিন্তু তজ্জাতীয় সর্বসংসহ গাছের সহিত  
 সংযোজিত হইলে আর সে সকল আশঙ্কা থাকে না। জয়বণ্টী,  
 সমুদ্রক্লেশ, এডোয়ার্ড প্রভৃতি কয়েকটা গোলাপ গাছ সর্ব দেশের  
 শীত-তাপ সহনে সক্ষম এবং সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই প্রফুল্লিত  
 থাকে। এই জন্ত ইহাদিগের সহিত কোমল প্রকৃতি ও পরিবর্তন-  
 শীল গাছ সম্মিলিত হইলে প্রথমোক্ত বৃক্ষগণ মৃত্তিকা হইতে রস  
 আহরণ করিয়া শেথোককে জীবিত রাখে। এইরূপ আশ্রয়  
 পাইলে শেথোক উদ্ভিদকে কোন কার্য্যই করিতে হয় না কেবল  
 মাত্র আহরিত রসকে স্বীয় জাতিগত প্রক্রিয়ানুসারে পরিপাক  
 করিয়া নিজ প্রাধান্ত রক্ষা করিতে হয় মাত্র। উল্লিখিত কারণ  
 বশতঃ বীজোৎপন্ন গাছের প্রকৃতিও অনেক স্থলে পরিবর্তিত  
 হইয়া থাকে কিন্তু অন্ত এক গাছের উপরে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে  
 আর সেরূপ ঘটে না। অতঃপর ইহাও দেখা যায় যে, কোমল

প্রকৃতি পরবৃক্ষ (Scion) বৃদ্ধিশীল ও তেজাল চারায় সন্মিলিত হইলে সমধিক পরিপুষ্ট লাভ করিয়া ফলন-ফুলনাদি বিষয়ে ক্রমে উন্নতি লাভ করে।—জোড়-কলম করিবার জন্ত বর্ষাকাল প্রশস্ত। আবশ্যক হইলে শীতকালেও জোড় বাঁধিতে পারা যায়, কিন্তু এ সময়ের কলমে জোড় লাগিতে অনেক সময় লাগে এবং অনেক কলমে জোড় লাগেই না। যাহা হউক, চারা ও যোজনীয় শাখা অনুরূপ স্থল হওয়া আবশ্যক। যোজনীয় শাখা নির্বাচন করিয়া তাহার ভাবী মিলন (Join) স্থানের সন্নিকটে চারা গাছকে ঈষৎ হেলাইয়া একপে ভূমিতে রোপণ করিতে হইবে যে, যোজনীয় শাখাকে টানিয়া অনায়াসে চারার সহিত সংলগ্ন করিতে পারা

১১ নং চিত্র



যায়। অতঃপর উভয়ের সন্মিলনের স্থান হইতে তীক্ষ্ণ ছুরী দ্বারা এক বা দুই ইঞ্চি কাষ্ঠ সমেত ছাল তুলিয়া লইতে হইবে। একপে


বাম হস্ত দ্বারা কর্তিত স্থানদ্বয়কে একত্রিত করিয়া ধারণ করতঃ উত্তমরূপে বাধিয়া দিতে হইবে। রোদ্রাদি না লাগে—এজ্ঞ জোড়ের স্থানটীকে সম্পূর্ণরূপ ঢাকিয়া দিতে হয়। জোড়ে রোদ্র বা বাতাস লাগিলে জোড় দৃঢ় হয় না।

ফাস্তন হইতে আখিন মাস অগধি চোক, চোঙ্গ, ও জিব-কলম

করিবার সময় কিন্তু চৈত্র বৈশাখের প্রথর  
চোক-কলম রোদ্র ও শুষ্ক বাতাসে ক্ষত স্থান শুকাইয়া

বাইবার সম্ভাবনা বলিয়া, সে দুই মাস মধ্যে কলম না করিয়া বর্ষারস্ত্রে করিলে ভাল হয়। শাখা-কলমে চোক, চোঙ্গ ও জিব কলম করিতে হয়। উক্ত কলমের মধ্যস্থলে বা যে কোন স্থানে উর্দ্ধ হইতে নিম্ন দিকে দুই বা তিন অঙ্গুলি দীর্ঘ রেখা টানিতে হয়। তীক্ষ্ণ ছুরী দ্বারা সেই রেখাকে বিদীর্ণ করতঃ ধীরতা সহকারে সেই স্থানের দুই পার্শ্বস্থ ছাগকে ঈষৎ তুলিয়া তন্মধ্যে চোকটীকে প্রবিষ্ট করিয়া দিবে। অতঃপর চোককে শাখা-কলম মধ্যে আবদ্ধ করিয়া নব রজ্জু, কদলী-পেটিকা, কিম্বা সূত্রগুচ্ছ দ্বারা জড়াইয়া বাধিতে হইবে। কর্তিত স্থানটী উত্তমরূপে আবৃত করিয়া দিতে হইবে কিন্তু কেবল চোকটী মুক্ত থাকিবে। তেজাল গাছের তেজাল শাখার মধ্যস্থলের চোক সর্বদা বাহ্যন্য। চোক তুলিবার দুইটি নিয়ম আছে; ১ম,—ছাল সমেত চোক; ২য়,—কাষ্ঠ সংযুক্ত ছাল সমেত চোক। চোক উঠাইবার অল্প নির্দোষিত শাখায় নির্দিষ্ট চোকের এক অঙ্গুলি উচ্চ ও এক অঙ্গুলি নিম্ন পর্য্যন্ত ছুরী দ্বারা কাটিয়া তুলিয়া লইতে হইবে। নিম্নস্থিত চিত্রে তাহার প্রদর্শিত হইল।

১২ নং চিত্র ।



এইরূপে কাষ্ঠ সমেত চোক উঠাইয়া সাবধানে ছাল হইতে কাষ্ঠাংশে স্বতন্ত্র করিলে প্রথমোক্ত প্রকারের চোক হইবে, কিন্তু কাষ্ঠ স্বতন্ত্র না করিলে দ্বিতীয় প্রকারের চোক হইল। চিত্রস্থ চতুর্শাখী গাছের প্রথম শাখায় সরল দীর্ঘ রেখা, দ্বিতীয়ে,—সরল রেখার নিম্নভাগে প্রস্থে একটি এক-ষব দীর্ঘ রেখা ;—তৃতীয়ে,—চোক প্রবেশ করান হইয়াছে ; এবং চতুর্থ,—চোক বাঁধিয়া কলম শেষ হইয়াছে,—ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয়স্থ লম্বা রেখার নিম্নে প্রস্থ রেখা থাকিলে চোক প্রবিষ্ট করিবার অধিক সুবিধা হয়।—ইহার সকল কার্য্যেই ধীরতার আবশ্যক, চঞ্চল ব্যক্তির দ্বারা তাহা হয় না। তিন চারি সপ্তাহ মধ্যে চোক ফুটিয়া শাখা উদ্গত হয়। নিয়ন্ত্রিত গাছে চোক সংস্থাপন করিতে হইলেও এই প্রণালী অবলম্বনীয়।

চারি গাছের অর্দ্ধ অরিপকাংশ অবধি রাখিয়া উপরিভাগ  
কর্তন করিয়া ফেলিতে হয়। অতঃপর অপর  
চোক-কলম গাছ হইতে, চোক সহ দুই অঙ্গুলি দীর্ঘ পরিমাণ



পরিপক্ক ডাল কাটিয়া তাহা হইতে কাঠ বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। কাঠ বহিষ্কৃত হইলে ছাল খণ্ড নল বা চোঙ্গের আকার ধারণ করে। এক্ষণে চারার শিরোভাগ বা অগ্রাংশ হইতে ঠিক চোঙ্গ পরিমাণ স্থানের সমগ্র ছাল তুলিয়া ফেলিয়া, তাহাতে চোঙ্গটিকে সাবধানে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া (চোঙ্গকে মুক্ত রাখিয়া) উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিতে হইবে। ইহাই হইল চোঙ্গ কলম। কাঠকে সহজে বাহির করিতে না পারিলে, ছালের উপরে ছুরী দ্বারা ঈষৎ চাপিয়া সরল দাগ দিলে বিদারিত স্থান হইতে ধীরে ধীরে উহাকে উঠাইতে পারা যায়। চোঙ্গ কোনরূপ না আঘাত লাগে,—সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। গোলাপের জন্ত চোঙ্গ বা জিব-কলম করিবার আবশ্যক হয় না।


চারাগাছের শিরোভাগে জিহ্বাকারে কর্তৃত কাঠ সহ চোঙ্গ স্থাপন করিলে জিব-কলম (Tongue graft)  
জিব কলম উৎপন্ন হয়। নিম্নস্থিত চিত্র দ্বারা সবিশেষ বুঝিতে পারা যাইবে।

১৩ নং চিত্র।



শাখা-প্রশাখার শেবাগ্রভাগকে ভূম্যাভিমুখে হেলানিয়া মৃত্তিকা দ্বারা ঢাকিয়া রাখিলে বক্রতার চরম দাবা-কলম স্থানে শিকড় বাহির হয়। অতঃপর শিকড় সমন্বিত শাখাকে আসল হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইলেই হইল। বর্ষাকালেই দাবা-কলম (Layer) করিতে হয়। গাছের শাখাকে ভূমির দিকে টানিয়া প্রথমে দেখিতে হয় যে, উহার ঠিক কোন স্থানটী ভূমি স্পর্শ করে। অতঃপর শাখার ঠিক সেই স্থানের দুই তিন অঙ্গুলি বিস্তৃত ছাল তুলিয়া ফেলিয়া কিঞ্চিৎ সেট স্থানে একটি 'ছে' দিয়া উহাকে মৃত্তিকা সংলগ্ন করিয়া দিয়া তৎপরে দুই তিন অঙ্গুলি পুরু করিয়া মাটি দিতে হয়। শাখাটি

১৪ নং চিত্র



মা স্থান বিচ্যুত হয় এজন্য শাখার প্রোথিতাংশের উপরে একখানি ইষ্টক রাখিয়া দেওয়া ভাল। দাবা-কলম এক মাস মধ্যে তৈয়ার হয় কিন্তু আরও ২১০ সপ্তাহ অপেক্ষা করিলে কলমে অধিক শিকড় জন্মে এবং তখন কাটিয়া আনিলে মরিয়া বাইবার আর বড় আশঙ্কা থাকে না। কলমে শিকড় জন্মিলেও একবারে

না কাটিয়া দুই দফায় কাটিলে সুবিধা হয়। এইরূপে অল্প কৰ্ত্তনকে 'ছে' কহে। প্রথম 'ছে' দিলে কলম যদি না ঝিমায়েয়া পড়ে, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, উত্তম শিকড় জন্মিয়াছে এবং তাহাকে স্বতন্ত্র করিবার সময় হইয়াছে। প্রথম 'ছে'র দুই চারি দিন মধ্যেই শেষ 'ছে' দিয়া সে স্থান হইতে কলমকে উঠাইয়া আনিয়া হাপোরে বা গামলায় রোপণ করিতে পারা যায়। প্রথম 'ছে'র পর গাছ বিমর্ষভাব ধারণ করিলে তাহাকে আরও ২১০ সপ্তাহ তদবস্থায় থাকিতে দিলে অধিক শিকড় জন্মিবার সম্ভাবনা এবং তখন তাহাকে কাটিলে চলিতে পারে।

অনেক গোলাপ গাছেরই এদেশে ফল হইয়া থাকে এবং

বীজ তাহার মধ্যে বীজ থাকে। ইহার ফল কুলের  
স্তায় কিন্তু বীজ পেয়ারা-বীজ সদৃশ। এদেশে

গোলাপের বীজ হইতে কাহাকেও চারা উৎপন্ন করিতে দেখা যায় না, তাহার কয়েকটা কারণ আছে। তন্মধ্যে বিশেষ কারণ—  
(১) বীজ হইতে চারা উৎপন্ন হইতে অনেক বিলম্ব হয়, এবং তাহাতে ফুল হইতেও অধিক দিন সময় লাগে; (২) বীজের চারা স্বীয় জাতিগত ধর্মরক্ষণে অনিশ্চিত। বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিতে পারিলে নূতন জাতির গোলাপ লাভ করিতে পারা যায়, এই কারণে বিলাতি গোলাপ ব্যবসায়ীগণ বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিয়া থাকেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, বীজের চারা স্বকীয় গৈভূক গুণ রক্ষণে অসমর্থ। এবম্বিধায় বীজের প্রকৃতি ও আকার এবং ফুলের গঠন, আকার বর্ণ, সৌরভ প্রভৃতি ও পরিবর্তনের অধীন স্ততরাং বীজের তজ্জাত পুষ্প প্রকারান্তর প্রাপ্ত হইতে পারে অর্থাৎ উৎকৃষ্ট হইতে পারে। তবে কৃত্রিম

উপায়ে জী-পুষ্পকে ইচ্ছামুরূপ পুষ্প-পুষ্পের রেণু ধার্য গর্ভিত করিতে পারিলে ভাল গোলাপ উৎপন্ন করিতে পারা যায়। এই প্রণালীকে crossing এবং তজ্জাত গাছকে সচরাচর Hybrid কহে। আজ কাল যে শত শত প্রকারের গোলাপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের মধ্যে প্রায় পনের আনারও অধিক স্বভাবজাত শব্দরতা প্রাপ্ত কিম্বা চেষ্টালব্দ। নূতন জাতির সৃষ্টি করিতে হইলে বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য। বীজোৎপন্ন চারা হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসর যে ফুল জন্মে তাহা সম্পূর্ণ নহে সুতরাং তৃতীয় বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, ফুল কিরূপ হয়। তিন বৎসর অতীত না হইলে বীজের পুষ্প পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। অতএব তৃতীয় বৎসরের পুষ্প যদি আশামুরূপ হয় তাহা হইলে তাহাকে যত্ন সহকারে পালন করিয়া অবিলম্বে তাহা হইতে প্রভূত পরিমাণে কলম করিয়া লওয়া উচিত। কোন দৈব দুর্কিগণকে নূতন চারা মরিয়া গেলে বড়ই মনস্তাপ হয়, এই জন্য অবিলম্বে ও প্রভূত পরিমাণে কলম করিবার কথা বলা গেল।

## দশম অধ্যায়

—:~:—

গোলাপ গাছের অনেকগুলি শব্দ আছে। ইহারা অনেক সময় গোলাপ বাগানে বড়ই উপদ্রব করিয়া থাকে। গোলাপের শব্দ কোন জাতি গাছের মূল কাটিয়া দেয়, কোন জাতি ডগা কাটিয়া দেয়, আবার কোন জাতি গাছের পত্র ভক্ষণ

করিয়া থাকে। অনেকের মত যে, গাছ তেজাল থাকিলে কোন কীট পতঙ্গ তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহা ঠিক নহে। গাছের স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধির প্রতি বৈরূপ দৃষ্টি রাখিতে হয়, কীট পতঙ্গে যাহাতে তাহার কোন অনিষ্ট সাধন করিতে না পারে তৎপ্রতিও সেইরূপ বা ততোধিক দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক।

গোলাপ-বাড়ীর ভীষণ শত্রু—উই-পোকা মৃত্তিকাতন্ত্রয়ে থাকিয়া বাহ্যের গোড়াকে এতই কাটিয়া দেয় যে, উই পোকা এক রাত্রি মধ্যেই গাছের বিনাশ সাধন করে। কোন কোন অভিজ্ঞের মত এই যে, গাছের জীবিত অংশে উই-পোকা কিছু করে না,—মৃত অংশকেই উহার আক্রমণ করে। গ্রাহকারের মত অন্তরূপ। গ্রাহকারের অভিজ্ঞতাজাত মত এই যে, সজীব নির্জীব নির্কিশেষে উহার গাছকে আক্রমণ করিল থাকে। আজ যে গাছকে সজীব ও সুন্দর দেখিতেছি, কল্যাণেই হয় ত তাহাকে বিমর্ষ ও স্ত্রিমমান দেখিতে হইবে এবং তাহার গোড়া হইতে মৃত্তিকা অপসারিত করিলে উই পোকাক দোঁড়িও প্রতাপ দেখিতে পাইব। গোড়া কাটিয়া গাছ মারিতে আর টটকে দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ইহাও দেখা যায় যে, উদ্ভিদের সূক্ষ্ম শিকড়ের প্রতি ইহাদিগের লোভ নাই, মূল ও মূল শিকড়ের প্রতি অধিক দৃষ্টি; সূক্ষ্ম শিকড় কাটিলে তত ক্ষতি হয় না, কিন্তু মূল শিকড় বা ভূমধ্যগত কাণ্ডকে আক্রমণ করিলে গাছ আর কিরূপে বাঁচিতে পারে? যাহা হউক, গাছ সহসা বিমর্ষ হইয়া পড়িলে বিনা কালবিলম্বে গোড়ার মাটি অপসারিত করিয়া হস্তারক দলকে সংহার করিতে হইবে।

উদনস্তর ক্ষত বা ভক্ষিত স্থানকে উত্তমরূপে বিধৌত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। গাছ নিতান্ত ত্রিয়মান হইয়া থাকিলে বৃষ্টিতে হইবে যে, অবস্থা সংঘাতিক। এতদবস্থায় উল্লিখিত প্রণালীতে গোড়ার পরিচর্যা করিয়া গাছের কতকগুলি শাখাকে মূল ঘেসিয়া, ও অপর গুলিকে খুব চোট করিয়া কাটিয়া দিতে হইবে। অনন্তর গাছটীকে অন্ততঃ ৭।৮ দিনের জন্ত দিবা ভাগে গামলা বা অপর কোন আবরণ দ্বারা ঢাকিয়া রাখা ও রাত্রিকালে খুলিয়া দেওয়া কর্তব্য। কয়েক দিবস গত হইলে গাছের চোক সমূহ যখন মুখরিত হইতেছে দেখা যাইবে, তখন আর গামলা ঢাকা দিবার প্রয়োজন হইবে না। উই-আক্রান্ত গাছের মূলে ভূঁতের জল দিবার জন্ত ল্যাণ্ডোলিকাস সাহেব ব্যবস্থা দিয়াছেন। তিনি কি প্রণালীতে উহা প্রস্তুত করেন, এস্থলে তাহার মর্শ্বোদ্ধৃত করিলাম।—এক ছোট চামচ (Tea-Spoon) পরিমাণ ভূঁতে চূর্ণ এক পোয়া (Tea-cups) উত্তপ্ত জলে মিশ্রিত কয়তঃ কীটা-ক্রান্ত গুচ্ছে প্রদান করিলে কীট নিশ্চই মরিয়া যাইবে।\*

এক জাতীয় ক্ষুদ্র পতঙ্গ গোলাপের পত্রের নিম্নে বাসা নিৰ্ম্মাণ

করে এবং গাছের পত্র ভক্ষণ করে। ইহদিগকে  
পতঙ্গ বিনাশ করা এবং বাসা ভাঙ্গিয়া দেওয়া উত্তম

ঔষধ। যে পত্রে ইহার আশ্রয় লয়, তাহা অগ্নাধিক সমুচিত হইয়া যায়। কেবল যে ইহার আপনারা পত্র ভক্ষণ করে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে ডিম্ব প্রসব করিয়া আপনাপন বংশ বৃদ্ধি করে

---

\* Indian amateur Rose Gardener by Landslicus, Page

এবং যথা সময়ে সেই ডিথ জাত পতঙ্গগণ গাছের সর্কাবয়বে বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। একরূপ হইলে গাছকে উত্তমরূপে স্নান করাইয়া সিক্ত বৃক্ষের সর্কাঙ্গে ছাই বা তামাক-পাতা চূর্ণ কিম্বা গন্ধক চূর্ণ ছড়াইয়া দিতে হয়। একরূপ করিলে আর তাহারা সে গাছে আশ্রয় লয় না। এইরূপে বহু গাছ আক্রান্ত হইলে তাবৎ গাছ হইতে বাসা ভাঙ্গিয়া উদ্ভিদগণের মধ্যে সায়ংকালে তামাকের বা গন্ধকের ধূম দিলে ভাল হয়। এই পতঙ্গের বর্ণ হরিৎ এবং ইহা এফিসিস্ (aphis) নামে অভিহিত।

এতদ্ব্যতীত লাল মাকড়সা গোলাপ গাছের বিষম শত্রু।

পত্রের নিম্নভাগে ইহারা আশ্রয় লয় এবং সাধারণ লাল মাকড়সা

উর্ণনাভের আয়তন বুনিয়া বাসা নির্মাণ করতঃ তন্মধ্যে বাস করে, পত্র ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে এবং ডিথ প্রসব করিয়া বংশ বৃদ্ধি করে। ইহাদিগকে বাছাই করিয়া বিনাশ করা কর্তব্য এবং আক্রান্ত পত্র সমূহকে গরম জল দ্বারা বিধোত করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়।

মৌয়া-পোকাকর আয় এক জাতীয় কীট সময়ে সময়ে গোলাপ

মৌয়া-পোকা গাছকে ভীষণরূপে আক্রমণ করে এবং পত্র ভক্ষণ করিয়া গাছের সমূহ অনিষ্ট সাধন করে।

ইহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া বিনাশ করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় দেখা যায় না।

উল্লিখিত কয়েক জাতির কীট ও পতঙ্গ ব্যতীত গোলাপের

আরও অনেক শত্রু আছে। গোলাপ বাড়ীর ধূম প্রদান

প্রতি সর্বদা দৃষ্টি থাকিলে আবির্ভাব মাত্রেই উহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় নতুবা অল্প দিন

মধ্যে উত্তানময় ডিম্ব ও ক্ষুদ্র জীব সকল ব্যাণ্ড হহয়া পড়ে। পোকা মাকড়ের প্রাচুর্য্য হইলে ক্ষেত্র মধ্যে সায়ংকালে ধূম দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। দিবাভাগ অপেক্ষা সন্ধ্যাকালই ধূম দিবার উত্তম সময়। সন্ধ্যাকালে বা রাত্রিতে ধূম উৎপন্ন হয়, তাহা, বায়ুনগুলের সিক্ততা হেতু অধিক উপরে উঠিতে না পারিয়া নিম্নেই বিচরণ করে। এতদ্বিবন্ধন ধূম ব্যাণ্ড দ্বারা নিকটস্থ উদ্ভিদগণ স্পর্শিত হইয়া থাকে। ধূমের গন্ধে কীট পতঙ্গ পলায়ন করে বা মরিয়া যায়।

গত বৎসর এক দল নিশাচর পতঙ্গ আমাকে উদ্ভাস্ত করিয়াছিল। ইহারা বড় ধূর্ত পতঙ্গ। দিনের বেলায় কোথায় লুক্কায়িত থাকে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। সূর্য্যাস্তের কিছু পরেই ইহারা আসিয়া গোলাপের পাতা ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং চারি দিন মধ্যে তাবৎ গোলাপ গাছকে একবারে পত্রহীন ও ডাঁটা-সার করিয়া দেয়। দুই চারিটা পাতা ভক্ষিত হইয়াছে দেখিলেই উপর্য্যুপরি ৩৪ দিন সন্ধ্যার পর বাগানের স্থানে স্থানে জলপূর্ণ গামলা রাখিয়া দিতে হয় এবং সেখানে অগ্নিকুণ্ড করিতে হয়। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে পতঙ্গগণ আলোকের নিকট—বোধ হয় দিন হইয়াছে মনেঃ করিয়া ছুটিয়া আসে এবং কতক অগ্নিতে, কতক জলে পতিত হয়। বাহারা এতদ্ব্যতীত না পড়িয়া লক্ষ্য রূপ করিতে থাকে তাহাদিগকে ধরিয়া হয় জলে, না হয় অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। প্রতিবিধানে কাল বিলম্ব করিলে তাবৎ গোলাপ পত্রহীন হইয়া পড়িবে। এই জাতীয় পতঙ্গ গোলাপের পত্র ও কচি ডগার বিশেষ পক্ষপাতী, কারণ, দেখা যায়, ইহারা গোলাপের সম্বিহিত কোন গাছের



পাতা ধীর না। পত্রই গাছের জীবন স্বরূপ,—পত্র ধারাই উদ্ভিদগণের শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সমাহিত হয়। পত্র হীন হইলে দণ্ড সমূহের তাবৎ গ্রন্থি হইতে নূতন ফৌকড়ি বাহির হইতে থাকে, ফলতঃ গাছ রুগ্ন ও শীর্ণ হইয়া পড়ে—গাছ কদাকার হইয়া যায়।

## একাদশ অধ্যায়

—:—:—

উদ্ভিদ ব্যবসায়ীদিগের তালিকা দৃষ্টে গোলাপ গাছ মিস্কাচম করা অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বড়ই কঠিন কাৰ্য্য।  
 গোলাপের তালিকা এই কারণবশতঃ অনেকে গাছ ক্রয় করিয়া নিরাশ হইয়া থাকেন। সচরাচর উদ্ভানে যে সকল গোলাপ রোপিত হয়, এত্বেলে সংক্ষেপে তাহার বিবরণ সহ তালিকা প্রদত্ত হইল।

## হাইব্রিড-পার্পেচুয়াল

- ১। আলফ্রেড-ডি-রোগমন্ট Alfred de Rougemont) ফুলের বর্ণ,—ঘন চক্কণ লাল ; সুঠাম ; গাছ সমুচ্চ ও তেজাল।
- ২। এণ্টনি ডুচার, (Antonie Ducher) উজ্জল ঘন রক্তিম বর্ণ ; অতি সুঠাম ও সুন্দর।
- ৩। এবি ব্রেমেরেল (Abbe Bramerel) বর্ণ উজ্জল রক্তিম মকুমলের স্থায়। গাছ সমুচ্চ।

- ৪। এলফ্রেড কলম্ব (Alfred Colomb) ফুল,—উজ্জল  
রক্তিম বর্ণের ; আকার বৃহৎ ; গঠন ঘন-বৃন্তক ।
- ৫। এনি উড (Anne Wood) ফুল,—উজ্জল সিন্দূর বর্ণের ;  
আকার বড় ; ঠাস-পাপড়ী ।
- ৬। বেরন-ডি-বন্সটেন (Baron de Bonsteten) উজ্জল ঘন  
রক্তবর্ণ । বুদ্ধিশীল ।
- ৭। ব্ল্যাক প্রিন্স (Black Prince) ঘন কৃষ্ণ লাল বর্ণের ;  
বড় ও ঠাস-পাপড়ী ।
- ৮। চার্লস লেফিবার (Charles Lefebere) ঘন সিন্দূর বর্ণের ;  
আকার বড় ।
- ৯। চার্লস ফন্টেন (Caarlet Fontaine) গাঢ় রক্তিম বর্ণের  
সুঠাম ।
- ১০। চার্লস উড (Charles Wood) সুঠাম গাঢ় লাল বর্ণের ।
- ১১। ডাক্তার এণ্ড্রি (Docteur Andry) গঠন সুন্দর, বর্ণ গাঢ়  
লাল, আকার বৃহৎ ।
- ১২। ডিউক অফ এডিনবরা (Duke of Edinburgh) উজ্জল ও  
গাঢ় লাল বর্ণের ।
- ১৩। ক্যামিলি বার্ণার্ডিন (Cammille Bernardin) বৃহদাকার  
উজ্জল লাল বর্ণের ফুল ।
- ১৪। ডক্ ডি রোহন (Duc de Rohan) উজ্জল সিন্দূর বর্ণের ;  
সুবৃহৎ ও অত্যন্তকট ।
- ১৫। ডুচার ডি কেলস্ (Ducheur de Caylas) উজ্জল লাল  
বর্ণের ; মধ্যমাকারের দোহারা ; গাছের আকার  
মধ্যবিধ ।

- ১৬। ফেলিক্স জেনিরো (Felix Genero) ফিকে গোলাপী ;  
আকার বড় ও সুঠাম। প্রথম শ্রেণীর গোলাপ।
- ১৭। ফ্রাঙ্কইন্স ফন্টেন্ (Francois Fontaine) রক্তিম বর্ণের ;  
বড় ও সুঠাম গাছ দীর্ঘ হয়।
- ১৮। ফ্রাঙ্কইন্স ট্রিভ (Francois Treyve) বড় ও লাল বর্ণের  
সুন্দর ফুল ; গাছ দীর্ঘ।
- ১৯। ফ্রাঙ্কইন্স লাকার্মি (Fancois Lacharme) লাল জাতির  
উজ্জল ও সুন্দর পুষ্প। গাছ বাড়াস্ত।
- ২০। ফর্ডিনান্ড ডি লেশেপ্‌স্ (Ferdinand de Lesseps) বড়  
ঘন-বৃন্তক বেগুনে বর্ণের সুন্দর ফুল। গাছ বাড়াস্ত।
- ২১। গ্লোরি ডি ডচার (Gloire de Ducher) ঘন রক্তিম  
বর্ণের সুঠাম পুষ্প।
- ২২। গ্লোরি ডি স্যান্টিনে (Gloire de Santenay) অত্যুজ্জল  
লাল বর্ণের সুন্দর ফুল। গাছ মধ্যমোচ্চ।
- ২৩। জেনারেল জ্যাকুইমিনট্ (General Jacqueminot) উজ্জল  
দাড়িম্ব ফুলের বর্ণ ; ফুল বড় ; বহু-পুষ্পী।
- ২৪। হোরেস্ ভার্ণেট (Horace Vernet) ঘন লাল বড় ফুল ;  
গাছ অতি বাড়াস্ত।
- ২৫। ইউজিনি ফষ্ট (Eugene Furst) ফুল—ঘন লাল মক-  
মলের বর্ণ ; আকার বৃহৎ ও পূর্ণায়ত প্রথম শ্রেণীর  
অস্বর্গত।
- ২৬। লুই ভ্যান হুট্ (Louise Van Houte) উজ্জল গভীর  
লাল বা কৃষ্ণাভ। প্রথম শ্রেণীর পুষ্প।

- ২৭। মার্শাল ভেল্যান্ট (Marechal Vaillant) সমুজ্জল বদনা  
বর্ণের, স্ঠাম, ও পূর্ণায়ত ; গাছ অতি বাড়ান্ত। প্রথম  
শ্রেণীর গোলাপ।
- ২৮। ম্যাডাম জ্যাকিয়ার (Madame Jacquir) সুবৃহৎ,  
স্ঠাম, ও পূর্ণায়ত বেগুনি বর্ণের। বাড়ন্ত গাছ।
- ২৯। পিয়ার নটিং (Piere Notting) রক্তিম বেগুনি বর্ণের  
পূর্ণায়ত বৃহদাকার সুন্দর ফুল। গাছ অতি বাড়ান্ত।  
প্রথম শ্রেণীর ফুল।
- ৩০। পিটর্ড (Pitord) ঘন রক্তিম মক্‌মলের বর্ণ, কোরক স্থল  
দাড়িম্ব বর্ণ। আকার বৃহৎ। গাছ বাড়ন্ত।
- ৩১। প্রিন্স ক্যামিলি-ডি-রোহান (Prince Camille de  
Rohan) গভীর রক্তিম মক্‌মলের বর্ণ ; আকার বড়,  
ও পূর্ণায়ত। বাড়ন্ত।
- ৩২। রেনল্ডস্ হোল (Reynolds Hole) রক্তিম বর্ণের,  
পূর্ণায়ত, স্ঠাম ও পেয়াল (cup) সদৃশ আকার।
- ৩৩। আমেরিকান বিউটি (American Beauty) উজ্জল লাল  
বর্ণের সুরভী গোলাপ।
- ৩৪। এণ্টনি মোটন (Antonie Mouton) উজ্জল গোলাপী  
বর্ণের।
- ৩৫। ব্যারনেস্ রথচাইল্ড (Baroness Rothschild) ফিকে  
গোলাপ।
- ৩৬। ক্যাপ্টেন ক্রীস্টী (Captain Christi) ফিকে গোলাপী ;  
স্ঠাম। মধ্যমাকার

- ৩৭। 'কেরোলাইন ডি সান্সাল (Caroline de Sansal) বর্ণ,  
ঘন গোলাপী আভাযুক্ত। সুঠাম ও সুন্দর। বহু  
পুষ্পদ।
- ৩৮। কোম্‌টেস্‌-ডি-সিরিনী (Comtesse de Sereyne) ফিকে  
গোলাপী বর্ণের বৃহদাকারের ফুল। বহু পুষ্পদ ও  
বাড়ন্ত।
- ৩৯। ককেট ব্ল্যাঞ্চে (Coquette Blanches)
- ৪০। এলিজাবেথ ভিগ্নেরন (Elizabeth Vigneron) ফিকে  
গোলাপী বর্ণের সুরতি গোলাপ।
- ৪১। লা ফ্রান্স (La France) ফিকে জীজ ফুলের বর্ণ, বৃহদা-  
কার ও সুন্দর।
- ৪২। ফায়ার ব্র্যান্ড (Firebrand) অগ্নি শিখা সমোজ্জল লাল  
বর্ণ ফুল; ঘন বৃন্তক।
- ৪৩। ম্যাডাম বল (Madam Boll) গোলাপী বর্ণের।
- ৪৪। ম্যাগ্না চার্টা (Magna Charta) উজ্জল গোলাপী বর্ণের  
বড় জাতীয় ফুল। বাড়ন্ত গাছ
- ৪৫। মেরি রেডি (Marie Rady) উজ্জল লাল বর্ণের, সুঠাম  
ও মনোহর।
- ৪৬। পল নিরন (Paul Neron) সর্সাপেক্ষা বৃহদাকার;  
সুরতি গোলাপী বর্ণের ফুল। গাছ কণ্টক হীন।  
মধ্যমাকার।
- ৪৭। প্রেসিডেন্ট মাস্ (President Moss) ঘন লাল বর্ণের  
ফুল।
- ৪৮। কুইন ভিক্টোরিয়া (Queen Victoria).

- ৪৮। সার ওয়াল্টার স্কট (Sir Walter Scott) উজ্জল লাল;  
সুসজ্জিত।
- ৪৯। মিসেস উড (Mrs. Wood) ফিকে লাল বর্ণের ফুল।
- ৫০। মণ্টী ক্রীষ্টো (Monte Christo) বড় জাতীয় গভীর  
জমাট রক্ত-বর্ণের ফুল; ঠাস্ ও বহু পাগড়ি-সমন্বিত;  
মধ্যস্থল সজ্জিত। অতি সুগন্ধ ও মনোহর গোলাপ।
- ৫১। ক্রাউন প্রিন্স (Crown Prince) সমুজ্জল বেগুণে বর্ণের  
সুন্দর গোলাপ।

## টী

- ১। ক্যাথারিন্ মার্মেট (Catharine Marmet) লাল বর্ণ;  
অকোঁনুক্ত পুষ্প বড়ই মনোহর।
- ২। ডিভোনিয়েন্সিস্ (Devoniensis) গাছ—লতিকা স্বভাব  
\*ও বাড়ন্ত; ফুল—হৃদে-হৃদে বর্ণের; সুঠাম ও সুন্দর।
- ৩। ইটোলি-ডি-লিয়ন (Etoile Lyon) সুন্দর জাফ্রান্ রঙ্গের  
ফুল।
- ৪। গ্লোয়ি-ডি-ডিজন (Gloire de Dijon) সুপরিচিত হরিদ্রা  
জাতির বর্ণ; বৃহদাকার ও বহু-পুষ্পী; অতি বাড়ন্ত।
- ৫। গ্রেস্ ডারলিং (Grace Darling) বর্ণ তুষার শুভ্র।
- ৬। মেরি ভ্যান হুটে (Marie Van Houte) গাছ প্রসারিণী;  
বহু পুষ্পদ; পুষ্পের বর্ণ হৃদ-হরিদ্রা, দলের শেবাগ্র ভাগ  
তাম্রবৎ ঈষৎ লাল। টী-জাতীয় মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট  
বলিয়া মনে হয়।

- ৭। মেরি গিলট (Marie Guillot) বর্ণ শুভ্র, অল্পমাত্র পীত সমাবিষ্ট।
- ৮। পার্ল-ডি-লিয়ন্ (Perle de Lyon) স্মৃঠাম ও ঘন পীত বর্ণের ফুল।
- ৯। পার্ফেকশন-ডি-মণ্ট-প্লেসার (Perfection de Montepalais) ফুলের বর্ণ—কেনেরি পক্ষীর তায় দ্বন্ধ-হরিদ্রা।
- ১০। সোম্ব্রুয়েল (Sombriel) প্রসারিণী ও বহু পুষ্পদা। বারো মাসই ফুল হয়। ফুলের বর্ণ শুভ্র কিন্তু অনেক ফুল লালানু, অনেক ফুল লাল ছিট সমন্বিত। ফুল তাদৃশ ঘন বা দীর্ঘ স্থায়ী নহে। ইহা 'সামরেল' নামে সচরাচর অভিহিত। জোড়-কলমাদির জন্ত ইহার শাখা কলম বড় প্রয়োজনীয়।
- ১১। এড্রিয়েন ক্রিষ্টোপোল (Adriene Chistophle) পীচ ফুলের বর্ণের ছায়া সমন্বিত হরিদ্রা বর্ণের বড় জাতির ও পূর্ণায়ত পুষ্প।
- ১২। আলবা রোজিরা (Alba Rosea) উত্তম গন্ধযুক্ত পূর্ণায়ত বৃহদাকার শুভ্র বর্ণের পুষ্প। পুষ্পের মধ্যাংশে গোলাপী বর্ণের ছায়া থাকে।
- ১৩। বেল-লিয়নেস (Belle Lyonnaise) বৃহদাকার ঘন দ্বন্ধ-হরিদ্রা বর্ণের পুষ্প।
- ১৪। চেসনট হাইব্রিড (Chestnut Hybrid) সামান্য হরিদ্রা সংযুক্ত শ্বেতবর্ণের পূর্ণায়ত গন্ধযুক্ত ফুল। স্পৃহনীয় গোলাপ।

## নয়জ্যেষ্ঠ

- ১। এমি-ভাইবার্ট (Amie Vibert) স্তবকে স্তবকে বহু পুষ্প  
ধারণ করে; ফুলের বর্ণ শুভ্র।
- ২। অ্যালিস্টার-গ্রে (Alister Stella Gray) বর্ণ-ঘন  
হরিদ্রা; আকার অপেক্ষাকৃত ছোট; স্তবকে স্তবকে  
ফুল হয় এবং বহু দিন ফুল প্রদান করে। ইহা  
অনেকাংশে W. A. Richardson গোলাপের স্ত্রা।
- ৩। আমেরিকা (America) লতাইবার পক্ষে বড় উপযোগী;  
পুষ্পের বর্ণ শ্বেত, মধ্যমাংশ দীর্ঘ লাল।
- ৪। বোকে-ডি-অর (Bouquet d' Orr) স্ত্রা হরিদ্রা বর্ণের  
ফুল।
- ৫। সেলিন-ফরেস্টার (Celine Forester) লতাইবার উপ-  
•যোগী সুন্দর গাছ; ফুলের বর্ণ—কেনেরি পক্ষীর স্ত্রা  
হৃৎ-হরিদ্রা; স্ত্রাম ও সুবাসিত। গাছ বড় বিক্ষিপ্ত  
স্বভাব, স্ত্রাং নিয়ত অস্ত্রাধীন রাখিতে হয়।
- ৬। ক্লথ-অফ-গোল্ড (Cloth of Gold) উত্তম লতানিয়া  
স্বভাবের গাছ; ফুল বিস্তৃত হরিদ্রা বর্ণের, মধ্যাংশ  
অধিকতর ঘন। বহু পুষ্পদ।
- ৭। লামার্ক (Lamarque) বৃহৎ ও পূর্ণায়ত; সামান্য পীত-  
চ্ছায়া সমন্বিত শুভ্র বর্ণের অতি মনোহর গোলাপ।  
উত্তম লতানিয়া স্বভাব।
- ৮। ডেসপ্রেজা ফ্লুর-জনে (Despreza fluer Jaune) বিক্ষিপ্ত



- লতিকা ; ঘন মলিন-পীত বর্ণের ফুল ; গোলাপী বর্ণের সমাবেশ আছে ।
- ৯। ফর্চু'ন্স ইয়েলো (Fortune's yellow) বড় জাতির, কমলা বর্ণের ফুল ; দেয়াল বা প্রাচীর গায়ে নিয়ন্ত্রিত করিবার উপযোগী দীর্ঘ ও বহু-শাখী বাড়ন্ত গাছ ।
- ১০। জীন-ডি-আর্ক (Jean de Arc) ফুল শুভ্র বর্ণের, কোরক স্থল গোলাপী ।
- ১১। লা-বিচি (La Biche) স্তম্ভে নিয়ন্ত্রিত করিবার উপযোগী। ফুলের বর্ণ শুভ্র ।
- ১২। লেডি অফ দি লেক (Lady of the Lake) ফুল,—মাঝারি আকারের ও শুভ্র বর্ণের । বহু পুষ্পক ।
- ১৪। ম্যাডাম কোরোলাইন কস্টার (Madame Caroline kuster) লালভ কমলা বর্ণের বড় ও পূর্ণায়ত পুষ্প ।
- ১৪। ম্যাডাম জীন সিসলী (Madame Jean Sisley) মাঝারি-ধরণের বর্ণের ফুল ; পাণ্ডুর শেষাগ্রভাগ গোলাপী ।
- ১৫। ম্যাডাম-লুই-হেনরি (Madame Louis Henry) খেত বর্ণের পুষ্প ; হরিজার ছায়াবিশিষ্ট ।
- ১৬। ম্যাডাম পিয়ার কচেট (Madame Pierre Cochet) মধ্যমাকারের পূর্ণায়ত ঘন ক্রম-অফ-গোল্ড-সদৃশ সুবর্ণ বর্ণের পুষ্প ; বহু পুষ্পক ; গাছ তেজাল ও খুব বাড়ন্ত । অতি মনোহর গোলাপ ।
- ১৭। মার্শাল নীল (Marechal Neil) তেজাল, বৃদ্ধিশীল ও লতাইবার উপযোগী । পুষ্পের বর্ণ—ঘন সুবর্ণ ; কোন কোন গাছের ফুলে পাণ্ডুর শেষাগ্রভাগ তাম্রবর্ণ ;

বহু পুষ্পক এবং প্রায় বারোমাসই ফুল হইয়া থাকে।  
প্রাচীর বা অট্টালিকা গায়ে নিম্নতরীয়। পড়ন্ত রোদ্দ-  
হীন স্থানে অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে। অতি মনোহর  
সুগন্ধী। গোলাপের মধ্যে বোধ হয় ইহাই উৎকৃষ্ট।

১৮। সল্ফেটিয়ার (Solfaterre) উজ্জল গন্ধক হরিদ্রা বর্ণের  
বড় ও পূর্ণায়ত পুষ্প।

১৯। ডব্লিউ, এ, রিচার্ডসন (W. A. Richardson) কুমলা  
লেবু বর্ণের, বৃহদাকার, পূর্ণায়ত উত্তম পুষ্প।  
উদ্ভানে অবশ্য রক্ষণীয়।

## মস্

১। ক্রিস্টা (Cristata) সূচাম গোলাপী বর্ণের ফুল।

২। সেলিনা (Celina) ঘন বৃত্তকে উজ্জল রক্তিম বর্ণের ফুল ;  
পেয়লা সদৃশ আকার।

৩। ইউজিনি ভার্ডিয়ের (Eugenie Verdier) উজ্জল লাল  
বর্ণের।

৪। লিউনেন (Lunen) ফুলের আকার বড়, বর্ণ উজ্জল  
রক্তিম।

৫। মার্কো ভিলোসা (Marco Villosa) ফুল,—শুভ্র বর্ণের,  
প্রক্ষুটিত হইবার পর ক্রমে গোলাপী বর্ণ ধারণ করে।

৬। মেরি-ডি-ব্লোইস্ (Marie de Blois) উজ্জল গোলাপী  
বর্ণের ফুল।

- ৭। ম্যাডাম ল্যাণ্ডো (Madame Landeau) উজ্জল গোলাপী  
বর্ণের ফুল, শুভ্র রেখা সম্বিত। সচরাচর ফুল হয় না।
- ৮। পার্পেচুয়াল হোয়াইট মস্ (Perpetual white moss)  
স্তবকে স্তবকে শুভ্র বর্ণের ফুল হয়।
- ৯। হোয়াইট মস্ (White moss) ফুল,—শুভ্র বর্ণের, ক্রমে  
লালচে রং প্রবল হয়।

## বোরবোঁ

- ১। লাভেনির (L' Avenir) ফুল—চিকণ গোলাপী, বড়  
ও পূর্ণাকার; গঠন, পোয়ালো সদৃশ; গাছ, বাড়ন্ত।
- ২। অ্যাসিডেলি (Acidalie) বড়, পূর্ণায়তন, শুভ্র বর্ণের ফুল;  
ঈষৎ লালচে বর্ণের ছায়া সম্বিত; উচ্চ দরের ফুল।  
গাছ খুব বাড়ন্ত।
- ৩। আরমোসা (Armosa) ফুল—মাঝারি; বর্ণ,—ফিকে  
গোলাপী; বহু পুষ্পক।
- ৪। ক্যাথারিন গীলট (Catharine Guillot) পূর্ণাকারের বড়  
লাল বর্ণের ফুল; গড়ন—পোয়ালো সদৃশ; বুদ্ধিশীল।
- ৫। ব্যারন ডি নরমন্ট (Baron de Normoint) উজ্জল  
গোলাপী বর্ণের, সুঠাম, সুন্দর ও অতি সুগন্ধ পুষ্প।
- ৬। বোকে-ডি-ফ্লোর (Bouquet de Flore) উজ্জল বর্ণের  
সুবাসিত ফুল। আকার, বড় ও পূর্ণ; গঠন,—  
পোয়ালো সদৃশ ও সুন্দর; গাছ,—অতিশয় বাড়ন্ত।

- ৭। ভিরিডিফ্লোরা (Viridiflora) প্রায় বারোমাসই পুষ্প  
প্রদান করিয়া থাকে। পুষ্প—সবুজ বর্ণের ও ক্ষুদ্র  
কিন্তু অত্যন্ত শাখা-প্রশাখার শেবাগ্রভাগে অত্যন্ত  
সুবকে ৮।১০ টা ফুল হয়। গাছের বর্ণে ও ফুলের  
বর্ণে প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। গাছ দেড় হইতে দুই  
হাত উচ্চ হয়; টী-জাতির স্থায় শাখা-প্রশাখা-সম্পন্ন।  
কৌতূহলোদ্দেশ্যে উড়ানে আশ্রয় পাইতে পারে।
- ৮। ম্যাডোল-ডি-পারফেকশন্ (Mdle de Perfection) বড় ও  
পূর্ণাকারের উজ্জল গোলাপী বর্ণের ফুল।
- ৯। সার জোসেফ প্যাক্সটন্ (Sir Joseph Paxton) বড় ও  
পূর্ণাকারের উজ্জল গোলাপী বর্ণের ফুল; রক্তিমাতা-  
সমন্বিত। গাছ,—বাড়ন্ত। প্রাচীর বা স্তম্ভে নিয়ন্ত্র-  
নের উপযোগী।
- ১০। স্মভেনির ডি লা ম্যালমেসন (Souvenir de la Mal-  
maison) ফুল,—সুঠাম; সুন্দর ও ঘনবৃন্তক; পূর্ণা-  
কার ও বড়; টাটকা মাংসের স্থায় বর্ণ। অতি উত্তম  
জাতির গোলাপ। গাছ,—বাড়ন্ত ও বহু পুষ্পক।

## বোরসল্ট \*

- ১। আমাডিস্ (Amadis) ফুল ঘন বেগুণে বর্ণের, ও মাঝারি  
আকারের; গাছ,—বাড়ন্ত ও দীর্ঘ-দণ্ডী; স্তম্ভে

---

\* বোরসল্ট জাতির গোলাপ প্রাচীর বা বৃক্ষশ্রেণীর উত্তরদিকে রোপণ  
করিলে ভাল থাকে। ইহারা তত রোজ সহনক্ষম নহে।

নিরন্তর করিবার যোগ্য। অবনামিত আকারে  
নিরন্তর করিবার যোগ্য; স্তবকে স্তবকে বহু পুষ্প  
ধারণ করে।

২। গ্রেসিলিস (Gracilis) ফুলের গঠন—বাটির তায়;  
আকার—মাঝারি; বর্ণ—লাল।

## সুইট-ব্রায়ার

(Sweet Briar)—ইহার তিন চারিটা মাত্র জাতি আছে,  
কিন্তু এদেশে একটা মাত্র দেখা যায়। ইহার ফুল ক্ষুদ্র ও নগণ্য,  
কিন্তু পত্র সমূহ অতি সুবাসিত। গাছ দেখিলে টী শ্রেণীর  
অন্তর্গত বলিয়া মনে হয় বস্তুতঃ ইহাদিগের প্রকৃতি ও আকার  
'টী' শ্রেণীর গাছের তায়। দণ্ড—দীর্ঘ হয় এবং ক্ষুদ্র দণ্ড সকল  
ছোট ফেঁকড়ি ভরা। সুইট-ব্রায়ার বিশিষ্ট স্থানে রোপণীয়। ফুলে  
এক স্তবক পাগড়ী থাকে; বর্ণ ফিকে গোলাপী। ফুলের সমন্বয়  
—চৈত্র-বৈশাখ। গাছ ছাঁটিবার আবশ্যক হয় না।

## ডামাস্ক

এই শ্রেণীর অন্তর্গত দুইটা মাত্র জাতি দেখা যায়।  
এতদ্ব্যতয়ের গাছ বা ফুলের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয় না।  
এক জাতির ফুল ফিকে গোলাপী। অন্য জাতির ফুল শুভ্রবৎ।  
এদেশে সচরাচর বসুয়াই বা বসোরা গোলাপ নামে খ্যাত হইয়া

থাকে। গাছ—মাঝারি আকারের। এই জাতির গোলাপ হইতে আতর ও গোলাপ জল প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে ফুল হয়।

## জাইগ্যান্টিয়া

(*Rosa Gigantia*)—ইহাই জয়বন্তী গোলাপ নামে অভিহিত। সচরাচর ইহারই শাখা-কলমের উপর নানা প্রকারের কলম বাঁধা হইয়া থাকে। জয়বন্তীকে অমর গাছ বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। সকল দেশে ও সকল প্রকার জমিতেই জয়বন্তী গাছের প্রতিপত্তি থাকে বলিয়া কলম বাঁধিবার জন্ত বিশেষ উপযোগী। যেমন উহার বাড়ন্ত স্বভাব, তেমনই উহার দণ্ড সমূহ সুদীর্ঘ হয়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে প্রত্যেক ডগায় স্তবকে স্তবকে পুষ্প ধারণ করে। প্রতি স্তবকে ২০।৩০।৪০।৫০ টী ফুল হয়। ফুলের আকার পয়সা বা আধুলির তায়; বর্ণ,—হুধে আলতা; গন্ধ,—অতি সামান্য। গাছে বারোমাস সমভাবে পত্র থাকে বলিয়া অসময়েও ইহার নয়নতৃপ্তিকর। পুষ্পের সময় অপরিসীম সৌন্দর্যাশালী। জয়বন্তীকে ছাঁটিতে হয় না। নিয়ন্ত্রিত গাছের আকার সংরক্ষণের জন্ত আবশ্যকমত শাখা-প্রশাখা কাটিয়া বা ছাঁটিয়া দিতে হয়। জয়বন্তী গোলাপের অধিক যত্ন সহ্য হয় না সুতরাং ইহার গোড়ায় নিরন্তর নিড়েন করা বা জল সেচন করা উচিত নহে। অপর গাছ উহার সহিত সংযোজিত হইলে যত্নের আবশ্যক হয়।

## মাইক্রোফিলা

(Rosa Microphylla) মাইক্রোফিলা গাছ সচরাচর ২৩ ফুট উচ্চ হয় কিন্তু অতিশয় বিক্ষিপ্তভাবে পার্শ্বদেশে প্রসারিত হয়। চৈত্র-বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত গাছে ফুল হয় ফুল—ঘন ও বহুবৃন্তক ; ফুলের বর্ণ,—ঘন হৃদে-আলতা। গাছ ছাঁটিতে হয় না। প্রাচীর বা বেড়ায় নিয়ন্ত্রিত করিলে মন্দ হয় না।

## দ্বাদশ অধ্যায়

সচরাচর গোলাপ শীত কালেই ফুটিয়া থাকে কিন্তু বহু ক্ষাভীক্ষ গোলাপের সময় গোলাপই সম্বৎসরে একবার শীতে ও একবার বর্ষায় পুষ্প প্রদান করিয়া থাকে। এতদ্বতীত বারোমাস যথারীতি পরিচর্যা করিলে অপর সময়েও ফুল পাওয়া যায়। আবার কতকগুলি গোলাপ, একারঙ্গা, দো-রঙ্গা, নানা জাতের টী, নয়সেট প্রভৃতি বারোমাস পুষ্প প্রদান করে। কেপ-গোলাপ (dog-rose) শীতে পুষ্প প্রদান করিতে পারে না। অনেক অপরাপর নানা জাতের গোলাপের সহিত কেপ-গোলাপকেও ছাঁটিয়া দিয়া থাকেন। এ সময়ে ছাঁটিয়া দিলে উহাতে রাশি রাশি কুঁড়ির আবির্ভাব হয়, কিন্তু সে সকল কুঁড়ি

প্রস্তুতি না হইয়া শুকাইয়া যায়। বোরসন্ট গোলাপ ও তাহাই। ইহাদিগকে না ছাঁটিলে শীতের শেষভাগে আপনাই পুষ্পিত হয়। সাম্ব্রেল বা সম্ব্রুয়েল (Sombriel) বারোমাস অবিশ্রান্তভাবে পুষ্প প্রদান করে। কোন প্রাচীরের উত্তরদিকে কিম্বা ঈষ-চ্ছায়াযুক্ত স্থানে অপেক্ষাকৃত অধিক ও ভাল পুষ্প প্রদান করে। গোলাপ অতি বৃহৎ উদ্ভিদ, এজন্য গোলাপে প্রচুর সার প্রদান ও প্রচুর জল সেচন করিতে পারিলে বারোমাসই অল্পাধিক ফুল পাওয়া যায়। সার একবারে সমধিক পরিমাণে না দিয়া, প্রতি মাসে বা প্রতি দুই মাসে অল্প পরিমাণ দিলে অধিকতর ফলদায়ক হয়। অতঃপর, পুষ্প চষন করিয়া লইবার পর কিম্বা উহা ঝরিয়া যাইবার পর পুষ্পিত দণ্ডের শিরোভাগ ছাঁটিয়া দিলে আবার তাহাতে ফুল হয়। বারোমাসই সমভাবে ফুল গ্রহণ করিলে স্বাভাবিক সময়ে ফুল নিকৃষ্ট হয়, এজন্য বারোমাসই বলপ্রয়োগ কিম্বা স্বাভাবিক ঋতুর পর গাছকে উত্তেজিত না করিয়া দাধারণভাবে পরিচর্যা করিলে গাছ সকল আপনাপন শক্তিমত ফুল প্রদান করিয়া থাকে এবং তাহাতে তাহাদিগের শক্তি ক্ষয় হয় না।

বর্ষার প্রারম্ভে বা মধ্যভাগে পুষ্পিত শাখা-প্রশাখার ডগা অপ্রোৎপাদন অল্পাধিক কাটিয়া দিলে দ্বিতীয় দফায় বহু পুষ্প পাওয়া যায়। আশ্বিন কার্তিক মাসে প্রায় তাৎক্ষণিক গোলাপ কণ্ঠিত হয় বলিয়া শীতের প্রথম ভাগে গোলাপ ফুল বড় দুপ্রাপ্য হয় এবং বাজারেও ফুলের মূল্য অধিক হইয়া থাকে এই সময়ে পুষ্প উৎপন্ন করিতে পারিলে, তাহার বড় আদর হয়। শীতের প্রারম্ভে পুষ্প উৎপন্ন করিতে হইলে ভাদ্র মাসে গাছের



পুরাতন' ডগা অল্লাধিক ছাঁটিয়া দিতে হয়। এ সময়ে বর্ষা থাকে, তখন গাছের গোড়া হইতে মাটি সরাইয়া দিবার আবশ্য-কতা নাই। এই প্রণালীতে পঁয়তাল্লিশ দিন মধ্যে গাছে পুষ্প আনয়ন করিতে পারা যায়। এইরূপে অগ্রে পুষ্প উৎপন্ন করিতে হইলে হই দফা গাছ রাখা উচিত। কারণ একই গাছ এত অল্প দিন মধ্যে দুইবার পুষ্প প্রদান করিতে পারে না। বিক্রয়ের জন্ত যাহারা অগ্রে পুষ্প উৎপন্ন করিতে চাহেন তাঁহাদিগের পক্ষে এ উপায় অবলম্বনীয়,—সৌখিনের পক্ষে নহে। সৌখানগণ ভাল ফুল চাহেন সুতরাং তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। জ্বরদস্তি করিয়া পুষ্প উৎপন্ন করিবার প্রথাকে Forcing বা Artificial wintering কহে। উদ্দীপনে ফুল আশানুরূপ হয় না, কারণ বর্ষায় গোলাপের এক দফা বর্দ্ধিত হইবার সময়। এই সময়ে বর্দ্ধিত হইয়া উহার হিম সমাগমে বিশ্রামগত হয়, কিন্তু শ্রান্তকে বিশ্রাম না দিয়া পুনরায় কার্যে নিযুক্ত করিলে কে কোথায় আশানুরূপ ফল পাইয়াছে? প্রসঙ্গক্রমে যখন কথা উঠিল, তখন বলিয়া রাখা উচিত যে,—

অপর্যাপ্ত গাছের ত্রায় গোলাপেরও বিরামের সময় আছে।

বিরামের দুইটা সময়। প্রথম—মুকুলিত হই-  
বিরাম ও বার পূর্বে; দ্বিতীয়—ফসলের পর। লক্ষ্য  
আগরণ রাখিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, মুকুলিত

হইবার পর ও ফলন-ফুলনের পর সকল উদ্ভিদই স্থির ভাব ধারণ করে। অনেক উদ্ভিদকে এক সময়েই দুই কার্য্য সমাধা করিতে দেখা যায়, কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত। বিরাম কালে উদ্দীপিত করিলে ফল জন্মিতে পারে, কিন্তু তাহাতে গাছের

শক্তি হ্রাস হয়,—গাছের ফলন নিকৃষ্ট হইয়া যায়। সে  
যাহা হউক, গোলাপ গাছ স্বভাবতঃ বর্ষাকালে বর্দ্ধিত হয়  
ও নূতন শাখা-প্রশাখায় সুশোভিত হয়। অতঃপর স্থিরভাবে  
ধারণ করে। যখন গোলাপ বিরামগত হয়, তখন শীত কাল।  
বৃদ্ধির পর শক্তিহীনতা হেতু গোলাপের পক্ষে নিশ্চেষ্ট ভাবে  
অবস্থান করা স্বাভাবিক। তাহা ব্যতীত, শীতসমাগমে প্রায়  
সকল উদ্ভিদেরই রস ঘনতা প্রাপ্ত হয়, ফলতঃ তাহারা সংকোচ-  
ভাব ধারণ করে। গোলাপকে শীতকালে যে আমরা প্রক্ষুটিত  
করি, তাহা কৃত্রিম উপায় দ্বারা। এতদুপায়ে উহাদিগের  
রস-সঞ্চালন ক্রিয়াকে আমরা উদ্দীপ্ত করি,—রস শোষণ শক্তিকে  
পীড়িত করি। এই সকল কারণে তাহাদিগকে পুষ্প প্রদানে  
বাধ্য হইতে হয়। এইরূপে উত্তেজিত না হইলে বিরামের সময়  
উহারা বিরামই লাভ করে, পরে স্বীয় শক্তিমত পুষ্প প্রদান  
করে। যে প্রক্রিয়া দ্বারা আমরা উদ্ভিদকে জাগরিত করি,  
তাহাকে কৃত্রিম জাগরণ নামে অভিহিত করাই উচিত।  
উল্লিখিত উপায়কে বরং বাহারা বল-প্রয়োগ বা Forcing কহেন  
তাঁহারা ইচ্ছাবাদী। জাগরণাবস্থায় উদ্ভিদ ক্রিয়াশীল থাকে,  
আহার, পরিশোধন, পরিচ্ছন্ন প্রভৃতি কার্য্যে তৎপর থাকে,  
কিন্তু বিরাম কালে সে সকল কার্য্যের গতি মন্দ হয়, গাছ  
নির্জীবাবস্থায় কালাতিপাত করে। কাহাকেও পীড়িত করা  
উচিত নহে, একথা শাস্ত্রানুমোদিত হইলেও ‘গরজ বড় বালাই।’  
গাভী পালন করি—হুগের জন্ত, বলদ পালন করি—শকট বা  
লাঙ্গল বাহিত করিবার জন্ত। গাছ পালন করি—ফল ফুলাদি  
লাভের জন্ত। সুতরাং বৎসর মধ্যে একবার নির্জীব গাছকে

আগরিত না করিলে চলে না এবং এই জন্তই গাছ ছাঁটিয়া দিই, গাছের গোড়া খনন করিয়া দিই। এতদ্বারা যে ক্ষতি করি তাহার পরিপূরণের জন্ত সার দিই, জল সেচন করি, আরও কত পরিচর্যা করি।

অনেকের এরূপ ধারণা আছে যে, মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থিত শিকড়

সমূহকে শিশির খাওয়াইবার জন্ত গাছের পাদ-  
বুদ্ধিরোধ

দেশের মৃত্তিকা খনন করিয়া দিতে হয় এবং

শিশির খাইলে গাছে নূতন শক্তির সঞ্চায় হয়, অধিক ফুল হয়, ভাল ফুল হয় ইত্যাদি। এস্থলে কারণ ও ফল ঠিক হইলেও, উদ্দেশ্য সঞ্চয়ে তাহাদিগের বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক। গাছের গোড়ার মৃত্তিকা অপসারিত হইলে শিকড় সমূহ রোজ, বায়ু, শিশির প্রভৃতির সংস্পর্শে আসে, তন্নিবন্ধন উদ্ভিদের বৃদ্ধির গতি আপাততঃ রুদ্ধ হয়। গোড়া খনন কালে স্তম্ভ ও কোন কোন স্থল শিকড়ও কাটিয়া যায়, ইহাতেও বৃদ্ধি রোধের সহায়তা হয়। অনন্তর কর্তিত শিকড় সমূহ হইতে নূতন স্তম্ভ শিকড় উদ্গত হইয়া মাটি হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে রস আহরণ করিতে সমর্থ হয়। রসাধিক্য হেতু উদ্ভিদগণ নব শক্তি সহকারে নূতন শাখা উদ্গত করে। এ সময়ে গাছে এত অধিক রসের সমাবেশ হয় এবং রসের সঞ্চালন ক্রিয়া এত প্রবল হয় যে, উদ্ভিদের বৃদ্ধি ক্রিয়া তাহাদিগের সহিত সমভাবে পাদবিক্ষেপ করিতে সক্ষম হয় না, অগত্যা বৃদ্ধির গতি পুষ্পিত হইবার দিকে ধাবিত হয়,—গাছে পুষ্প মুকুলের আবির্ভাব হয়। গাছের শাখা-প্রশাখা ছাঁটিয়া দিলে কিম্বা তাহাদিগের সংখ্যা হ্রাস করিয়া দিলে উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশে অধিক রসের সঞ্চায় হয়, তন্নিবন্ধন অল্পভাসিত

এহি বা চোক সকল পুষ্টি লাভ করিয়া শাখাকারে পরিণত হয়। শাখা-প্রশাখা না ছাটিয়া মূলদেশের মৃত্তিকা অপসারিত করিয়া দিবার পরে সার প্রদান ও জল সেচন করিলে গাছের অনুদাত পত্র-মুকুল সমূহ পূর্বোক্ত নিয়মে শাখায় পরিণত হয় এবং পুষ্প প্রদান করে। সকল কার্যের উদ্দেশ্য সম্যকরূপে অবগত থাকিলে স্ফটিকরূপে কার্য সিদ্ধ হয়, এই জন্ত এতৎসম্বন্ধে এত কথা বলা গেল।

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

গোলাপ বড় সখের সামগ্রী। যে নীরস হৃদয় কোন পুষ্প সৌখিনের সখ মধ্যে স্মৃথ পায় না, গোলাপের নিকট তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতেই হয়। এজন্ত সৌখিনের বাগান বা বাসস্থানে গোলাপের অন্ততঃ দুই চারিটা গাছ ও থাকিতে দেখা যায়। সৌখিনের বাগানে নানা জাতির গোলাপ থাকা আবশ্যক। প্রায় সকল স্থানেই লাল বর্ণের ও তদন্তর্গত নানা বর্ণের অর্থাৎ গোলাপী ফিকে-গোলাপী, ঘোর গোলাপী; রক্তিম, ফিকে রক্তিম, হুধে-আলতা, মেজেন্টা ইত্যাদি বর্ণের গোলাপের প্রাচুর্য্য অধিক। স্থল বিশেষে দুই চারিটা শুভ্র গোলাপ আর হরিদ্রা বর্ণের মার্শাল-নীল গোলাপ দেখা যায়। এই ত গেল বর্ণ সম্বন্ধে। অন্তঃপর শ্রেণীর বিষয় লক্ষ্য করিলে প্রায় সকল স্থানেই হাইব্রিড-পার্পেচুয়াল গাছের প্রাধান্য নয়ন গোচর হয়। এতদ্বারা যে হাইব্রিড-পার্পেচুয়ালকে অবজ্ঞা

করিতেছি তাহা নহে। অস্ত্রান্ত শ্রেণীর গাছও উদ্ভান মধ্যে বিশেষ স্থান পাইবার যোগ্য এতদ্বারা তাহাই প্রদর্শন করিতেছি। হাইব্রিড-গার্পেচুয়াল উত্তম ফুল। টী, নয়সেট প্রভৃতি তোহাপেক্ষা কিছুতেই অকিঞ্চিৎকর নহে, বরং স্থল বিশেষে ইহাদিগের নিকট হাইব্রিড-গার্পেচুয়াল পরাভূত হয়। তাহা ব্যতীত টী, নয়সেট, চাইনীজ (Chinese) প্রভৃতি গাছে অধিক দিন ও প্রায় বারোমাস অল্পাধিক পুষ্প পাওয়া যায়। হাইব্রিড-গার্পেচুয়াল শীতকাল মধ্যে কয়েকটা পুষ্প প্রদান করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া বিরামগত হয় কিন্তু 'টী' বা নয়সেট তাহা হয় না। এই কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর গাছ বাগানে রাখা উচিত। তাহা ব্যতীত টী ও নয়সেট গোলাপ ও হরিদ্রা বর্ণের গোলাপ উদ্ভান মধ্যে থাকিলে গোলাপ-ক্ষেতের সমতাবতা (monotony) বিদূরিত হয়, উদ্ভানকে সজীব বলিয়া মনে হয়। কেবল যে সৌখিনের সখ মিটাইয়া গোলাপের কার্য শেষ হইল তাহা নহে। সুসভ্য দেশ মাত্রেই গোলাপ গাছ হইতে লোকে অর্থোপার্জন করিয়া থাকে। এইজন্ত—

গোলাপ ব্যবসায়ীর পণ্য মধ্যে গণ্য। ইউরোপ আমেরিকা ব্যবসায়ীর পণ্য প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিই। এই বাঙ্গালা দেশেই অল্পকাল মধ্যে গোলাপের ব্যবসায় উত্তমরূপে দেখা দিয়াছে এবং দিন দিন পুষ্টি লাভ করিতেছে। ইদানীং গোলাপের গাছও যেরূপ বিক্রয় হইতেছে, ফুলও সেইরূপ বিক্রয় চলিতেছে। ফুল বিক্রয়ের জন্য কলিকাতার ত্রায় প্রধান প্রধান সহরই বিশেষ স্থান। গোলাপ ফুলের ক্রেতা সাহেব মহলেই অধিক। কলিকাতার নিউ-মার্কেট (New market) গোলাপ

ফুল বিক্রয়ের প্রধান আড্ডা। বারোমাস তথায় ফুল বিক্রয় হয়। শীতকালে ফুলের বাজার কিছু জমকাল হয়, কারণ সে সময়ে সাহেবদিগের বিবাহাদি বহু জিয়া কলাপ হইয়া থাকে, বড় দিনের (X'mas day) পার্কে থাকে, নব বর্ষ (new years day) থাকে, অনেক বাড়ীতে ভোজ হয়, বড় লাট প্রাসাদে লাট মহিষীর দরবার বা বৈটক (Drawing Room) হয় ইত্যাদি বহু কর্মোপলক্ষে ফুলের বড় চাহিদা (Demand) হয়। সে সময়ে দেড় টাকা হইতে পঁচিশ টাকা মূল্যে শতকরা গোলাপ ফুল বিক্রয় হয়। বড় দিনের পূর্ব সায়ংকালে (X'mas Eve) এক একটা ফুলও এক টাকায় বিক্রয় হওয়া আশ্চর্য্য নহে। বড়-দিনে বাজারে ফুল আমদানী করিতে পারিলে বিশেষ লাভবান হওয়া যায়। বড়দিনে ফুলের আমদানী করিতে হইলে কার্তিক মাসের প্রথম ভাগেই গোলাপ গাছকে কৃত্রিম উপায়ে জাগরিত করিতে হইবে। মাঘ মাসের শেষ ভাগে বড় বড় সাহেবরা পাহাড়ে চলিয়া যান, কাজেই গোলাপের কাটতি তখন অনেক হ্রাস পায়। এতদ্ব্যতীত—

গোলাপ পুষ্প হইতে আতর ও গোলাপ-জল প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা সকলেই অবগত আছেন। আতর ও  
 আতর ও গোলাপ-জলের জন্ত ভারতের মধ্যে গাজীপুর ও  
 গোলাপ জৌনপুর নামক স্থানদ্বয় বিখ্যাত। গোলাপের  
 বিস্তৃত আবাদ এবং আতর ও গোলাপের কারখানা দেখিবার  
 জন্ত বিগত সন ১৩১১ সালে আমি উক্ত দুই স্থান ভ্রমণ করিতে  
 গিয়াছিলাম। আতর গোলাপ তৈয়ার করিয়া ব্যবসা করিতে  
 হইলে জৌনপুর বা গাজীপুরে একবার যাওয়া নিতান্ত কর্তব্য।

এতৎ সম্বন্ধে ‘কমলা’ নামক মাসিক পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখিয়া-  
ছিলাম তাহার প্রয়োজনীয় অংশের মৰ্ম্ম এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।\*

\* \* “গাজীপুর যাইতে হইলে জেট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের  
দিলদারনগর ষ্টেশনে নামিতে হয়। ষ্টেশন হাবড়া হইতে  
৪৩৩ মাইল মাত্র। এখান হইতে তারি-ঘাট দশ মাইল মাত্র।  
তারি-ঘাটে যাইবার জন্য দিলদারনগর হইতে একটা শাখা  
লাইন গিয়াছে এবং এই শাখা লাইন তারিঘাটে গিয়া শেষ  
হইয়াছে। তারিঘাট গঙ্গার উপরে। ইহার অপর পারে গাজী-  
পুর সহর। তারিঘাট হইতে গাজীপুরের দৃশ্য অতি মনোহর,  
অনেকটা বারাগণী ধামের স্তায়—অন্ততঃ তাহাই আমার মনে  
হইল। \* \* \* গাজীপুর সহরের ২১৩ মাইল দক্ষিণে  
খজোলি গ্রাম। এখানকার অনেকে গোলাপ, বেল, যুই  
প্রভৃতির আবাদ করিয়া থাকে। পুষ্পাবাদীগণ সকলেই মুসলমান  
এবং বেশ সজ্জতিপন্ন বলিয়া বোধ হইল। আমি দূর দেশ হইতে  
ফুলের ক্ষেত দেখিতে গিয়াছি শুনিয়া তাহার আমাকে বড়ই  
বিস্ময় করিল। যাহার চারি বিঘা গোলাপ-ক্ষেত্র আছে, তাহাকে  
বর্দ্ধিস্থ বলিলে ক্ষতি হয় না কারণ প্রতি বিঘায় ৭৫ হিসাবে  
তাহার তিন শত টাকা আয় আছে। তিন শত টাকা আয়  
সম্পন্ন কৃষিজীবী বড় একটা বে-সে লোক নহে। সহস্র সহস্র  
বাঙ্গালী বৎসরে তিন শত টাকা রোজগার করিয়া থাকেন, কিন্তু  
তাহারা ইহাদিগের অপেক্ষা যে সম্পন্ন নহেন একথা দৃঢ়তার  
সহিত বলিতে পারি।.....

খজোলি গ্রামে বহু লোকের গোলাপের ক্ষেত্র আছে এবং তৎসমুদায়েই বসরাই (Damask) গোলাপের গাছ। প্রতি বিঘায় এক-লক্ষ গোলাপ-ফুল উৎপন্ন হয় এবং এক লক্ষ ফুলের মূল্য ৭৫ টাকা। গোলাপ-চাষীগণ কারখানার সত্বাধিকারী-দিগকে প্রতিদিন টাটকা ফুল সরবরাহ করে এবং শেষোক্ত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ কারখানায় আতর ও গোলাপ প্রস্তুত করেন। মহাজনদিগের কারখানা গাজীপুর সহরে। ফাল্গুন চৈত্র মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত বসরাই গোলাপের ফুল হয় এবং এই কয় মাসই আতর ও গোলাপ প্রস্তুত হইয়া থাকে। মহাজনের লোক-জনেরা এই সকল ফুলকে বৃহৎ বৃহৎ তাম্বের (কলাই করা) ডেক্‌চিতে আবদ্ধ করিয়া যথানিয়মে চোলাই করে। ডেক্‌চির মধ্যে জল থাকে। সেই ফুল জলে নিক্ষিপ্ত হইলে ডেক্‌চির মুখ একখানি ঢাকনি দ্বারা উত্তমরূপে আঁটিয়া দেওয়া হয়। উক্ত ঢাকনির মধ্যস্থলে একটি ছিদ্র থাকে। একটা নলের একমুখ সেই ঢাকনির ছিদ্রে ও অপর মুখ একটা পাত্রে সংলগ্ন থাকে। ডেক্‌চির জল ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইয়া বাষ্পাকার ধারণ করতঃ ঢাকনির ছিদ্র ভেদ করিয়া নলের ভিতর দিয়া পাত্রান্তরে বাহিতে থাকে। নলের ভিতরের বাষ্পকে তরল করিবার জন্ত নলের উপরে অগ্নি অন্ন করিয়া জল দিবার জন্ত একজন লোক নিযুক্ত থাকে। সে ব্যক্তি ক্রমাগত জল সেচন দ্বারা সেই নলটিকে শীতল রাখিবার চেষ্টা করে। নল শুষ্ক হইয়া গেলে তদন্তর্গত বাষ্প ও শুষ্ক হইয়া যায়।.....যে পাত্রে বাষ্প জল হইয়া আসিয়া পড়ে, তাহা তাম্র নির্মিত কলাই করা কূঁজা বিশেষ।.....পাত্রস্থিত জল ক্ষণকাল মধ্যে শীতল হইয়া গেলে, জলের উপরিভাগে সর পড়ে।



সেই সর স্বতন্ত্র করিয়া লইলেই আতর হইল, আর যে জল অবশিষ্ট থাকে তাহাই গোলাপ জল। গোলাপ-জল ও আতর কিরূপ বহুল পরিমাণে বিক্রয় হয়, গাজীপুর বা জৌনপুরে না গেলে বুঝিতে পারা যায় না। কারখানা-বাড়ী বেশ বড়,— অনেক লোকজন থাকে। প্রতি দিন নানা দেশে আতর ও গোলাপ-জল প্রেরিত হয়। ভারতের নানা স্থানে তা হয়ই, অন্য দেশেও প্রেরিত হয়।”

বসোরা গোলাপ বাতীত কেপ-গোলাপ (Dog Rose বা Rose Edward) নামক গোলাপ ফুল হইতে আতর ও গোলাপ জল প্রস্তুত হইতে পারে।

আতর, গোলাপ, ও নানাবিধ ফুলের ও মুলের তৈল ও ফুলের

ঔষধ আরক প্রস্তুত করিতে পারিলে উত্তম ব্যবসায়

চলিতে পারে। অল্প অর্থ ব্যয়ে এ সকল কারবার

আরম্ভ করিতে পারা যায়। এ সকল জিনিষ উৎপন্ন করিতে অধিক ব্যয় পড়ে না অথচ তাহাদিগের মূল্যও যথেষ্ট। মূল্যের আধিক্য হেতু প্রচুর পরিমাণে পণ্য উৎপন্ন হয় না, সুতরাং এক্ষেত্রে অবতরণ করিলে লাভবান হইবার বিশেষ আশা আছে। এক বিঘায় ১৬০০ শত গোলাপ গাছ (২×২ হাত) রোপিত হইতে পারে এবং তাহাতে এক লক্ষের অধিক পুষ্প উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। প্রতি এক হাজার ফুলে প্রায় ১/১১০ দেড় সের গোলাপ জল উৎপন্ন হয়, কিন্তু উৎকৃষ্ট গোলাপজল ১/১ এক সেরের অধিক হয় না। এই হিসাবে এক বিঘা ফুলে (দশ-সের) উত্তম গোলাপ জল পাওয়া যায়। দশ সের গোলাপ জল হইতে এক ভরি উৎকৃষ্ট আতর উৎপন্ন হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট আবাদ হইলে ফুল

বড় হয়, ফুলের পরিমাণ অধিক হয়, ফলতঃ আতর অধিক হয়।  
এক ভরি আসল আতরের মূল্য ৯০ হইতে ১০০ শত টাকা, কিন্তু  
সচরাচর বাজারে যে আতর বিক্রীত হয়, তাহাতে দুই চারি  
ফোঁটা আতর থাকে, অবশিষ্ট চন্দনের তৈল বা সুইট-অয়েল,  
কিথো অতি নিকৃষ্ট আতর।

—:~:—

সমাপ্ত।











